

THE FULGOROMORPHA AND CICADOMORPHA OF TURKEY . PART I: MEDITERRANEAN REGION (HEMIPTERA)

Emine Demir*

* Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500 Teknikokullar, Ankara, TÜRKİYE. E-mail: eminedemird@yahoo.com

[**Demir, E.** 2008. The Fulgoromorpha and Cicadomorpha of Turkey. Part I: Mediterranean region (Hemiptera). *Munis Entomology & Zoology* 3 (1): 447-522]

ABSTRACT: The paper gives faunistical review of the Fulgoromorpha and Cicadomorpha of Mediterranean Region in Turkey.

KEY WORDS: Fulgoromorpha and Cicadomorpha, Fauna, Mediterranean Region, Turkey.

INTRODUCTION

The first faunistic records were given by Fahringer (1922), Haupt (1930), Kerville (1939), Zachvatkin (1937, 1946) and Linnavuori (1965). The first comprehensive study on Turkish Auchenorrhyncha was carried out by Dlabola who is a Czech scientist, in 1957. Dlabola described many new species from Turkey and gave numerous faunistic records for Turkey in this work and his other works (1957, 1971a, 1971b, 1974a, 1974b, 1977, 1979a, 1979b, 1980, 1981, 1982, 1983a, 1983b, 1984, 1985a, 1985b, 1986, 1987, 1989, 1994). On the other side, Asche (1982), Remane & Hoch (1985) also gave many records from Turkey in their works. On this subject, Kalkandelen also published many papers (1972, 1974, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989a, 1989b, 1990, 1993, 1994, 2000). Then, Lodos & Kalkandelen prepared a faunistic list of Turkish Auchenorrhyncha species and they published into a series comprising of 27 articles (1980 – 1988). According to this work, 725 Auchenorrhyncha species were present in Turkey. Kartal (1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988) and then Zeybekoğlu and his team (1992, 1994a, 1994b, 1994c, 1997, 1998, 2000, 2001), Güçlü (1996, 1997), Başpınar & Uygun (1991a, 1991b, 1991c, 1992a, 1992b), Meyer-Arndt (1988, 1991), Boulard (1979, 1993) Emeljanov (2003), Gnezdilov (2002) ve Demir (1998, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, Demir, 2006c, 2006d, Demir, 2007a, 2007b) gave many Auchenorrhyncha records for Turkey and described some new species from Turkey.

Although the suborders Fulgoromorpha and Cicadomorpha are very rich groups, it has not completely been determined yet, how many species are present in Turkey. Works carried out in Turkey until now are incomprehensive and only related to some regions of Turkey. For this reason, these studies do not include sufficient faunistic records for many regions of Turkey. Consequently, these regions have not been studied fully enough yet. To determine Turkish fauna entirely, many works should be carried out in local areas especially. As the first step of this, the present data must be compiled, so unstudied regions will appear.

With this study, the aim was to compile all existent records of the species of Fulgoromorpha and Cicadomorpha from Turkey. Hence, a series work is planned with the is aim to expose Turkish Fulgoromorpha and Cicadomorpha fauna as possible in detail and entirely beginning with the Mediterranean Region. This present study is an attempt at the first step of this aim.

Turkey is divided into seven regional parts commonly. These are;

Marmara Region (North-West Turkey)

A. European Turkey (=Thrace)

1. Ergene Part (including Edirne and Tekirdağ provinces)
2. Istanca Part (including Kırklareli province)
3. Çatalca Part (including İstanbul province)

B. Asian Turkey (=North-West Anatolia)

1. Kocaeli Part (including Kocaeli and Sakarya provinces)
2. South Marmara Part (including Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir and Çanakkale provinces)

Aegean Region (West Turkey)

1. Aegean Part (including Manisa, İzmir, Aydın, Muğla and Denizli provinces)
2. Central-West Anatolia Part (including Kütahya, Uşak and Afyon provinces)

Mediterranean Region (South and Sout-West Anatolia)

1. Antalya Part [= Western Mediterranean] (including Burdur, Isparta and Antalya provinces)
2. Adana Part [=Eastern Mediterranean] (including İçel, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş and Kilis)

Central Anatolian Region

1. Upper Sakarya Part (including Eskişehir and Ankara provinces)
2. Konya Part (including Konya, Aksaray and Karaman provinces)
3. Central Kızılırmak Part (including Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri and Sivas provinces)

Black Sea Region (North Anatolia)

1. Western Black Sea Part (including Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu and Sinop provinces)

2. Central Black Sea Part (including Samsun, Çorum, Amasya, Tokat and Ordu provinces)
3. Eastern Black Sea Part (including Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize and Artvin provinces)

Eastern Anatolian Region

1. Erzurum-Kars Part (including Ardahan, Kars, Erzurum and Iğdır provinces)
2. Upper Fırat Part (including Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl and Bitlis provinces)
3. Upper Murat-Van Part (including Ağrı, Muş and Van provinces)
4. Hakkari Part (including Şırnak and Hakkari provinces)

South-Eastern Anatolian Region

1. Central Fırat Part (including Gaziantep, Adıyaman and Şanlıurfa provinces)
2. Dicle Part (including Diyarbakır, Mardin, Batman and Siirt provinces)

Abbreviations of the names of countries and regions

AC: Africa	AE: Aegean Is.	AF : Afghanistan
AL: Albania	AM: Armenia	AN: Andorra
AR: Afro-tropical region	AS: Australian region	AT: Austria
AO: Azores	AZ: Azerbaidjan	BE: Belgium
BG: Bulgaria	BH: Bosnia and Herzegovina	BI: Balearic Is.
BO: Bohemia	BS: Belarus	BT: Britain Is.
CA: Croatia	CH: Channel Is.	CI: Canary Is.
CO: Corsica	CL: Cyclades Is.	CR: Crete
CS: Czech Republic	CY: Cyprus	DE: Germany
DK: Denmark	DO: Dodecanese Is.	EE: Estonia
EP: East Palaearctic	ER: Ethiopian region	ES: Spain
FI: Finland	FR: France	GG: Georgia
GI: Gibraltar	GR: Greece	HU: Hungary
IC: Iceland	IE: Ireland	IR: Iran
IQ: Iraq	IL: Israel	IT: Italy
JO: Jordan	KG: Kazakhstan	KK: Kirgizia
LA: Latvia	LB: Libanon	LI: Lithuania
MC: Macedonia	MD: Moldova	ME: Madeira
ML: Malta	MN: Mongolia	MO: Monaco
MV: Moravia	NA: Nearctic region	NE: Near East
NL: Netherlands	NO: Norway	NR: Neotropical region
OR: Oriental region	PL: Poland	PT: Portugal
RO: Romania	RU: Russia	SA: Sardinia
SB: Serbia	SC: Sicily	SE: Sweden
SL: Slovakia	SN: Slovenia	SW: Switzerland
SY: Syria	TJ: Tajikia	TN: Tunisia
TR: Turkey	TM: Turkmenia	UA: Ukraine
UZ: Uzbekistan	YU: Yugoslavia	

ARRANGEMENT OF INFORMATION

Information in the present text is given in the following order:

The high taxa names are given simply.

For the genus names, the synonyms are provided under the taxon names.

For each species, the synonyms are provided under the taxon names.

The data, **Distribution, Distribution in Turkey** under the title for each taxon is given.

Distribution. In these parts, the whole distribution areas in the world are provided for each taxon.

Distribution in Turkey. On the first line (in paranthesis) abbreviations of the provinces in Turkey are given. These parts include previous records that have been given by various authors in different literatures. The whole records are evaluated as only the concerning province and locality in the related reference. Each record is accompanied by the author's name and publication date of the related reference.

Abbreviations of the provinces in Turkey

01: Adana	02: Adıyaman	03: Afyon
04: Ağrı	05: Amasya	06: Ankara
07: Antalya	08: Artvin	09: Aydın
10: Balıkesir	11: Bilecik	12: Bingöl
13: Bitlis	14: Bolu	15: Burdur
16: Bursa	17: Çanakkale	18: Çankırı
19: Çorum	20: Denizli	21: Diyarbakır
22: Edirne	23: Elazığ	24: Erzincan
25: Erzurum	26: Eskişehir	27: Gaziantep
28: Giresun	29: Gümüşhane	30: Hakkari
31: Hatay	32: Isparta	33: İçel
34: İstanbul	35: İzmir	36: Kars
37: Kastamonu	38: Kayseri	39: Kırklareli
40: Kırşehir	41: Kocaeli	42: Konya
43: Kütahya	44: Malatya	45: Manisa
46: Kahraman Maraş	47: Mardin	48: Muğla
49: Muş	50: Nevşehir	51: Niğde
52: Ordu	53: Rize	54: Sakarya
55: Samsun	56: Siirt	57: Sinop
58: Sivas	59: Tekirdağ	60: Tokat
61: Trabzon	62: Tunceli	63: Şanlı Urfa
64: Uşak	65: Van	66: Yozgat
67: Zonguldak	68: Aksaray	69: Bayburt
70: Karaman	71: Kırıkkale	72: Batman
73: Şırnak	74: Bartın	75: Ardahan
76: Iğdır	77: Yalova	78: Karabük
79: Kilis	80: Osmaniye	81: Düzce

Order: HEMIPTERA
Suborder: FULGOROMORPHA
Family: CIXIIDAE
Subfamily: CIXIINAE
Tribe: CIXIINI

Genus: *Cixius* Latreille, 1804

***Cixius (Ceratocixius) pallipes* Fieber, 1876**

Distribution: BG?, CO, CY?, FR, GR?, HU, IT, MD?, RO, SA, SL?, SW, YU?, SB, EP?, NE, AF, IQ, IL, TR, AM, AZ, GG, TJ.

Distribution in Turkey: (01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 55, 60, 63, 66, 70, 74, 76, 81).

Adıyaman prov.: Kahta, Afyon prov.: Dinar, Ankara prov.: Çubuk, Artvin prov.: Borçka, Fidanlık, Aydın prov.: Söke-Samsun dağı, Balıkesir prov.: Balya, Dursunbey, Çanakkale prov.: Gökçeada, Diyarbakır prov., Erzincan prov.: Bahçeliköy, Erzurum prov.: Uzundere, Gaziantep prov.: Bostancık, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Gümüşhane prov.: Torul, Hakkari prov.: Yüksekova, İzmir prov.: Ödemiş-Bozdağ, Konya prov.: İçeri Çumra, Kütahya prov., Mardin prov.: Ömerli, Cizre, Muğla prov.: Marmaris, Ordu prov.: Kumru, Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Sapanca gölü, Malatya prov.: Balaban, Karahan Province, Nurhak Mountain (Dlabola, 1981); Artvin prov.: Centre, Aydın prov.: Söke-Samsundağı, Balıkesir prov.: Balya, Dursunbey, Bolu prov.: Düzce-Çavuşlar, Çanakkale prov.: Gökçeada, Çankırı prov.: Çatalelma, Karacahasan, Diyarbakır prov.: Centre, Erzincan prov.: Bahçeliköy, Centre, Erzurum prov.: Uzundere, Eskişehir prov.: Çavlum, Çifteler, Gaziantep prov.: Bostancık, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Gümüşhane prov.: Torul, Hakkari prov.: Yüksekova, İzmir prov.: Bozdağ, Iğdır prov.: Centre, Kırşehir prov.: Centre, Hırfanlı, Konya prov.: Çumra, Ermenek, Karaman prov.: Centre, Kütahya prov.: Centre, Maraş prov.: Elbistan, Göksun, Mardin prov.: Ömerli, Cizre, Muğla prov.: Marmaris, Köyceğiz, Ordu prov.: Kumru, Samsun: Centre, Tokat prov.: Centre, Turhal, Urfa prov.: Ceylanpınar, Yozgat prov.: Sorgun, Bartın prov.: Centre (Kalkandelen, 1988); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, SW Demirciköy) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Manavgat (Değirmenli) (Demir, 2007a).

***Cixius (Ceratocixius) remotus* Edwards, 1888**

Distribution: BE, BT, BG, FR, GR, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 25, 42).

Adana prov.: Tufanbeyli, Erzurum prov.: Centre, Konya prov.: Kulu (Kalkandelen, 1988); Ankara prov.: Kızılcahamam (Dlabola, 1989); Ankara prov.: Kalecik (İdrisdağı) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

Genus: *Tachycixius* Wagner, 1939

Synonym: = *Siculus* Dlabola, 1980

***Tachycixius bidentifer* Dlabola, 1971 (FLOW³ da 1960)**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 27, 30, 33, 46, 47).

Adana prov.: Düziçi, Kadirli, Gaziantep prov.: Merkez, Oğuzeli, Hakkari prov.: Çukurca, Mardin prov. (Kalkandelen, 1988); Maraş prov., Gaziantep prov. (Dlabola, 1971a).

***Tachycixius creticus* Dlabola, 1974**

Distribution: CR, TR.

Distribution in Turkey: (31).

Hatay prov.: Soğukoluk (Kalkandelen, 1988).

***Tachycixius desertorum* (Fieber, 1876)**

Distribution: AL, AM, AZ, BG, CY, CS, GR, HU, GG, KG, IL, IT, RO, S-RU, SC, SL, TR, UA, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (02, 06, 07, 08, 21, 22, 26, 27, 30, 77, 35, 37, 42, 33, 45, 47, 48, 50, 57, 64).

Edirne prov., Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam as *Cixius desertorum* Fieber, 1876 (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Gerger, Diyarbakır prov., Hakkari prov.: Çukurca, İzmir prov.: Çeşme, Dikili, Sabuncubeli, Manisa prov.: Akhisar, Mardin prov.: Derik, Muğla prov.: Fethiye (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Sapanca gölü (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Elmalı, Korkuteli, Artvin prov.: Suluböcükhane, Diyarbakır prov.: centre, Akmescit, Ergani, Edirne prov., Eskişehir prov.: Sarıcakaya, Gaziantep prov.: Bostancık, Yalova prov., Kastamonu prov.: Küre, Konya prov.: Çumra, İçel prov., Manisa prov.: Akhisar, Mardin prov.: Kapılı-Silopi, Nevşehir prov.: Boyalı, Sinop prov.: Mertoğlu, Uşak prov. (Kalkandelen, 1988); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Karagöl) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy, İdrisdağı) (Demir, 2007b).

***Tachycixius pilosus* (Oliver, 1791)**

Synonym: = *albicincta* Germar, 1818 = *contaminata* Germar, 1818.

Distribution: AZ, AT, BE, BT, BG, CY, CS, DK, FR, DE, GB, GR, HU, IE, IT, LI, NL, NO, PL, PT, RO, SC, SL, ES, SE, SW, TN, TR, UA, YU, EP, NE, NR, N-AC.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 10, 21, 35, 59, 63).

İzmir prov.: Efes (Dlabola, 1971a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Dlabola, 1974a); Ankara prov., Tekirdağ prov.: Şarköy (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Adana prov.: Ceyhan, Antalya prov.: Korkuteli, Balıkesir prov.: Centre, Balya, Diyarbakır prov.: Merkez, Urfa prov.: Ceylanpınar (Kalkandelen, 1988).

Tribe: OECLEINI

Genus: *Myndus* Stal, 1862

Synonym: = *Entithena* Fieber, 1866

***Myndus musivus* (Germar, 1825)**

Distribution: AT, BE, BG, CS, E-TR, FR, DE, GR, HU, IT, PL, RO, M-RU, S-RU, SW, NL, UA, YU, EP, NE, AF, TR, AZ, KG, UZ.

Distribution in Turkey: (06, 14, 18, 22, 23, 32, 35, 46, 47, 48, 62, 65).

Edirne prov. (Dlabola, 1957); Elazığ prov., Isparta prov.: Eğridir, Mardin prov.: Nusaybin, Muğla prov., Tunceli prov., Van prov.: Başkale-Güzelsu, Beyüzümü, Edremit (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Ankara prov.: Beypazarı, Bolu prov.: Seben, Çankırı prov.: Başdıbek, İzmir prov.: Kemalpaşa, Maraş prov.: Elbistan (Kalkandelen, 1989a).

Tribe: DUILIINI

Genus: *Duilius* Stal, 1858

Synonym: = *Bitropis* Dlabola, 1985 = *Duiliopsis* Bergevin, 1933 = *Haplacha* Lethierry, 1874 = *Hemitropis* Fieber, 1866

***Duilius seticulosus* (Lethierry, 1874)**

Distribution: BT, CI, CY, IT, SA, SC, ES, AR, EP, NE, N-AC, TR, AF, DZ, EG, IQ, IL, MA, TN, AZ, TJ.

Distribution in Turkey: (07, 24, 46, 50).

Antalya prov.: Kaş, Olympus, Erzincan prov.: Ilıç as *Hemitropis seticulosa* Leth. (Kalkandelen, 1989a); Erzincan prov.: Ilıç, Maraş, Nevşehir: Avanos as *Hemitropis seticulosa* Lethierry, 1874 (Lodos & Kalkandelen, 1988); Antalya prov.: Manavgat (Taşağıl, Hacıobası), Serik (Aspendos) (Demir, 2007a).

***Duilius tamaricis* (Puton et Lethierry, 1887)**

Distribution: S-RU, EP, KG, TR, UZ.

Distribution in Turkey: (07, 09, 17, 19, 24, 35, 44, 48, 50, 55).

Malatya prov.: Darende, Balaban as *Hemitropis tamaricis* Puton et Lethierry, 1887 (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Kemer, Olympus, Nevşehir prov.: Avanos, Samsun prov.: Kavak as *Hemitropis tamaricis* Puton et Leth. (Kalkandelen, 1989a).

Tribe: PENTASTIRINI

Subtribe: PENTASTIRINA

Genus: *Pseudoliarus* Haupt, 1927

***Pseudoliarus palestinensis* (Linnavuori, 1962)**

Distribution: IL, TR.

Distribution in Turkey: (21, 79, 47).

Diyarbakır prov., Kilis prov., Mardin prov.: Nusaybin (Kalkandelen, 1989b).

Genus: *Eumecurus* Emeljanov, 1971

***Eumecurus bourouensis* (Linnavuori, 1965)**

Distribution: BG, GR, TR.

Distribution in Turkey: (07, 45).

Antalya prov.: Kaş, Manisa prov.: Gördes (Kalkandelen, 1989b).

***Eumecurus gyaurus* (Dlabola, 1957)**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 07).

Adana prov.: Tapan, Gavur Dağı as *Oliarus gyaurus* sp.n. (Dlabola, 1957); Adana prov.: Hasanbeyli, Antalya prov.: Kaş (Kalkandelen, 1989b); Antalya prov.: İbradı (Üzümdere), Düzlerçamı (Demir, 2007a).

Genus: *Pentastiridius* Kirschbaum, 1868

***Pentastiridius* (*s. str.*) *leporinus* (Linnaeus, 1761)**

Synonym: = *latifrons* Walker, 1851 = *pallens* Germar, 1818 = *pallida* Herrich-Schäffer, 1835. **Distribution:** AF, DZ, AL, AT, AM, AZ, BE, BT, CN, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, KG, KK, LA, LI, MN, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 04, 06, 07, 09, 13, 18, 21, 25, 31, 33, 36, 42, 46, 47, 50, 51).

Maraş prov.: Yarbaşı, Bulgar Dağı as *Oliarus leporinus* L. (Fahringer, 1922); Ağrı prov.: Doğubeyazıt, Ankara prov.: Eymir gölü, Aydın prov.: Söke-Samsun dağı, Bitlis prov.: Hizan, Diyarbakır prov.: Deve geçidi, Erzurum prov.: Hasankale, Tufanç köyü, Mardin prov.: İdil, Nevşehir prov.: Avanos, Boyalı, Çardak (Lodos & Kalkandelen, 1980a); İçel prov.: Erdemli as *Oliarus pallens* Germar, 1821 (Dlabola, 1981), İçel prov.: Erdemli as *Oliarus leporinus* Linnaeus, 1761 (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Finike, Adana prov.: Düziçi, Karataş, Ankara prov.: Nallıhan, Çankırı prov.: Başdibek, Çatalelma, Ilgaz, Karacahisar, Konak, Yerkuyu, Erzurum prov.: Centre, Kuyular, Hatay prov.: Dört Yol, İçel prov.: Tarsus, Kars prov.: Aralık, Konya prov.: Ereğli, Maraş prov.: Andırın, Niğde prov.: Centre (Kalkandelen, 1990); Antalya prov.: Finike (Demir, 2007a).

Genus: *Setapius* Dlabola, 1988

***Setapius klapperichianus* Dlabola, 1988**

Distribution: JO, TR.

Distribution in Turkey: (07):

Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Finike (Yeşilyurt), Kemer (Böğürtlenözü, Centre), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Değirmenli, Demirciler, Beşkonak, Örenşehir, Çakış), Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

***Setapius barajus* (Dlabola, 1957)**

Distribution: AF, TR, AM, GG.

Distribution in Turkey: (01, 04, 06, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 76, 44, 47, 49, 50, 55, 57, 56, 58, 64).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj *Oliarus barajus* sp.n. (Dlabola, 1957); Adana prov.: Pozantı *Oliarus barajus* Dlab. (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Çubuk, Eymir gölü, Bursa prov.: İnegöl, Süpürtü, Diyarbakır prov., Elazığ prov.: Karakoçan, Kinderiz, Erzincan prov.:

Bahçeliköy, Erzurum prov.: Tufanç köyü, Gümüşhane: prov. Kelkit, İzmir prov.: Ayrancılar, Kemalpaşa, Iğdır prov., Malatya prov., Mardin prov.: İdil, Nusaybin, Muş prov., Samsun prov.: Bafra, Sinop prov.: Boyabat, Gerze, Siirt prov., Sivas prov.: Suşehri (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Ağrı prov., Nevşehir prov.: Ürgüp, İçel prov.: Erdemli as *Oliarus barajus* Dlabola, 1957 (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Nallıhan, Denizli prov.: Acıpayam, Erzincan prov.: Çayırılı, Mardin prov.: Cizre, Uşak prov.: Banaz (Kalkandelen, 1990).

***Setapius lindbergi* (Dlabola, 1957)**

Distribution: AF, CY, S-RU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 33, 27, 63).

Adana: prov. Kozan, Toros as *Oliarus lindbergi* sp.n. (Dlabola, 1957); İçel prov.: Erdemli as *Oliarus lindbergi* Dlabola, 1957 (Dlabola, 1981); Adana prov.: Centre, Ceyhan, Kozan, Karataş, Antalya prov.: Aksu, Gülloluk, Serik-Gebiz, İçel prov.: Tarsus, Gaziantep prov.: Nizip, Urfa prov.: Birecik, Suruç (Kalkandelen, 1990).

Genus: *Pentastira* Kirschbaum, 1868

***Pentastira major* Kirschbaum, 1868**

Distribution: AL, AM, CR, CY, DO, GR, HU, IQ, IT, JO, LB, SY, N-AE, TR, UA, NE, TR.

Distribution in Turkey: (06, 14, 51, 01, 07, 18, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 42, 45, 70, 46, 47, 49, 55, 59, 60, 63, 65, 66:

Ankara prov.: Baraj *Oliarus major* Kirschbaum, 1868 (Dlabola, 1957); Ankara prov., Bolu prov.: Gerede, Niğde prov.: Ulukışla *Oliarus major* Kirsch. (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Etimesgut, Eymir gölü, Çankırı prov.: Şabanözü, Diyarbakır prov.: Akziyaret, Kağıtlı, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Isparta prov.: Keçiborlu, İzmir prov.: Selçuk, Manisa prov.: Kula, Mardin prov.: Silopi, Samsun prov., Tekirdağ prov., Tokat prov.: Zile, Urfa prov.: Hilvan, Van prov.: Çatak (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Adana prov.: Hasanbeyli, Pozanti, Ankara prov.: Ayaş, Beypazarı, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı, Şereflikoçhisar, Antalya prov.: Alanya, Çorum prov.: İskilip, Osmaniçik, Diyarbakır prov.: Centre, Ergani, Gaziantep prov.: Araban, Nizip, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Hatay: Kırıkhan, Konya: Beyşehir, Akköy, Seydişehir, Karaman, Maraş: Elbistan, Nurhak Dağı, Muş prov.: Centre, Yozgat prov.: Çekerek (Kalkandelen, 1993); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

***Pentastira megista* Emeljanov, 1978**

Distribution: AF, AZ, BG, CS, GR, HU, RO, RU, SL, SY, TR, UA, YU.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 18, 21, 25, 42, 70, 49, 51, 66).

Adana prov.: Hasanbeyli, Pozanti, Ankara prov.: Ayaş, Eymir, Kalecik, Polatlı, Çankırı prov.: Centre, Diyarbakır prov.: Centre, Erzurum prov.: Üzundere, Konya prov.: Beyşehir, Karaman prov., Muş prov., Niğde prov., Yozgat prov.: Aydıncık, Kazankaya (Kalkandelen, 1993); Antalya prov.: İbradı (Ormana) (Demir, 2007a).

***Pentastira torossica* (Dlabola, 1957)**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Bürücek, Toros, Suluhan, Ağapınarı as *Oliarus torossicus* sp.n. (Dlabola, 1957).

Genus: *Reptalus* Emeljanov, 1971

***Reptalus (Trepalus) rufocarinatus* (Kusnezov 1937)**

Synonym: = *bitinctus* Dlabola, 1961.

Distribution: S-RU, UA, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 25, 36, 76, 46, 65).

Adana prov.: Tufanbeyli, Ankara prov.: Şereflikoçhisar, Erzurum prov.: Aşkale, Iğdır prov., Kars prov.: Tuzluca, Maraş prov.: Centre, Nurhak dağı, Van prov.: Van Gölü as *Setapius bitinctus* Dlab. (Kalkandelen, 1990).

***Reptalus (s. str.) quinquecostatus* (Dufour, 1833)**

Distribution: AT, BE, CS, TR, FR, DE, GR, HU, IT, MD, RO, S-RU, SL, ES, UA, YU, EP, NE.

Distribution in Turkey: (04, 05, 08, 11, 17, 22, 23, 25, 32, 34, 35, 76, 39, 44, 49, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 06, 14, 74, 81, 50).

Edirne prov., Ankara prov.: Mogan Gölü as *Oliarus quinquecostatus* Dufour, 1833 (Dlabola, 1957); Bartın prov.: Akçakoca as *Oliarus quinquecostatus* Duf. (Linnavuori, 1965); Ağrı prov.: Doğubeyazıt, Karabulak, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Amasya prov., Artvin prov.: Murgul, Bilecik prov.: Pazaryeri, Çanakkale prov.: Ayvacık, Edirne prov.: İpsala, Elazığ prov.: Kinderiz, Erzurum prov.: Aşkale, Isparta prov.: Atabey, İstanbul prov.: Erenköy, İzmir prov.: Dikili, Ödemiş-Bozdağ, Iğdır prov., Kırklareli prov.: Lüleburgaz-Türkgeldi, Malatya prov., Muş prov., Samsun prov.: Terme, Siirt prov.: Kurtalan, Tekirdağ prov.: Barbaros, Tokat prov.: Niksar, Trabzon prov., Urfa prov.: Ceylanpınar, Hilvan, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Ankara prov.: Bala as *Oliarus quinquecostatus* Dufour, 1833 (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Çubuk, Kazan, Kızılcahamam, Tuzgölü, Düzce, Nevşehir prov.: Gülşehir (Kalkandelen, 1994).

***Reptalus (s. str.) melanochaetus* (Fieber, 1876)**

Distribution: AZ, BG, CS, FR, GR, HU, IR, IT, KG, MD, RO, S-RU, SL, ES, TR, UA, YU, NE.

Distribution in Turkey: (06, 08, 09, 11, 21, 22, 25, 28, 32, 35, 34, 39, 71, 31, 40, 41, 48, 59).

Ankara prov.: Ayaş *Oliarus melanochaetus* Fieber, 1876 (Dlabola, 1957); Ankara prov., İzmit prov., Silivri as *Oliarus melanochaetus* Fieb. (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Çubuk, Artvin prov.: Balkır, Fidanlık, Murgul, Taşköy, Aydın prov.: Söke-Samsun dağı, Bilecik prov.: Gölpazarı, Diyarbakır prov., Edirne prov.: Keşan, Erzurum prov.: Hasankale, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Ayrancılar, Selçuk, Kırklareli prov.: Lüleburgaz, Vize, Muğla prov.: Bodrum, Tekirdağ prov.: Hayrabolu (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Ankara prov.: Ayaş, Çubuk, Kazan, Kızılcahamam, Kırıkkale, Hatay prov.: Yayladağ, Kırşehir prov.: Hirfanlı (Kalkandelen, 1994).

***Reptalus oleae* Dlabola, 1987**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07, 48, 33).

Antalya prov.: Kaş, Muğla prov.: Köyceğiz (Dlabola, 1987); Antalya prov.: Kaş, İçel: Silifke (Kalkandelen, 1994); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Gündoğmuş (Güneycik), Korkuteli (Centre-Kargalık), Manavgat (Beşkonak, Köprülü Kanyon, Demirciler, Tilkililer) (Demir, 2007a).

***Reptalus (s. str.) horridus* (Linnavuori, 1962)**

Synonym: = *zercanus* Dlabola, 1965.

Distribution: GR, IL, JO, LB, TR, NE.

Distribution in Turkey: (35, 01, 06, 07).

İzmir prov.: Ödemiş, Tire, Adana prov.: Gavur Dağı (Kalkandelen, 1994); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), İbradı (Başlar), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

Genus: *Hyalesthes* Signoret, 1865

Synonym: = *Liorhinus* Kirschbaum, 1868 = *Pseudhyalesthes* Kusnezov, 1935

***Hyalesthes hani* Hoch, 1985**

Distribution: LB, IL, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Akseki (Kalkandelen, 2000).

***Hyalesthes luteipes* Fieber, 1879**

Distribution: AT, BH, BG, CO, CA, FR, DE, GR, IT, PT, SA, SC, ES, TR, TM, YU, NE.

Distribution in Turkey: (06, 07, 34, 09, 38, 42, 33, 19, 21, 40, 42, 70, 46, 50, 66, 67).

Silivri, Ankara prov.: Kızılcahamam (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1957); Diyarbakır prov.: Centre, Kulp (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Nevşehir prov.: Ürgüp

(Dlabola, 1981).; Ankara prov.: Gdl, Kalecik, Çorum prov., Kırşehir prov.: Hirfanlı, Konya prov.: Beyşehir, Hadim, Karaman prov., Maraş prov.: Centre, Nevşehir prov.: Avanos, Glşehir, Yozgat prov., Zonguldak prov.: Eflani (Kalkandelen, 2000); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

***Hyalesthes mavromoustakisi* Dlabola, 1959**

Synonym: = *aither* Linnavuori, 1971.

Distribution: CY, N-AE, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 21).

Diyarbakır prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980); Antalya prov.: Gndoğmuş (Serinyaka), Korkuteli 30 km W (Demir, 2007a).

***Hyalesthes mlokosiewiczzi* Signoret, 1879**

Distribution: AM, AZ, CY, IR, IQ, RU, TR, TM, UA, UZ, CY, IR, TR, AM, AZ, GG, S-RU, TM.

Distribution in Turkey: (01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 15, 18, 21, 27, , 73, 79, 32, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 56, 60, 63).

İçel prov.: Alata (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Glbaşı, Aydın prov.: Kuşadası, Bilecik prov.: Glpazarı, Burdur prov.: Glhisar, Diyarbakır prov.: Lice, Silvan, Isparta prov.: Eğirdir, İzmir prov.: Bornova, Şemikler, Malatya prov., Mardin prov.: Ömerli, Muğla prov.: Kyceğiz, Marmaris, Şırnak prov., Tokat prov.: Erba, Urfa prov.: Gverti (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Topaluşaağı, Fırat-Flusses, Malatya prov.: Balaban (Dlabola, 1981); Afyon prov.: Centre, Ankara prov.: Ayaş, Nallıhan, Adana prov.: Hasanbeyli, Burdur prov.: Ağlasun, İnsuyu, Çankırı prov.: Şabanz, Gaziantep prov.: Oğuzeli, Yavuzeli, Kilis prov., Isparta prov.: Eğirdir, Yakren, Uluborlu, Maraş prov.: Andırın, Afşin (Kalkandelen, 2000); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası) (Demir, 2007a).

***Hyalesthes obsoletus* Signoret, 1865**

Synonym: = *albolimbatus* Kirschbaum, 1868.

Distribution: AL, AT, BI, BH, BG, CO, CR, CA, CL, CY, CS, DO, TR, FR, DE, GR, HU, IT, MC, ML, N-AE, PT, RO, M-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC.

Distribution in Turkey: (01, 02, 04, 06, 34, 07, 09, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 76, 47, 33, 42, 48, 03, 06, 81, 14, 15, 18, 32, 44, 45, 46, 48, 28, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 81).

İstanbul prov.: Polenezky (Fahringer, 1922); Edirne prov., Ankara prov.: Mogan Gl, Beynam, Baraj, Adana prov.: Kozan, Toros, Misis (Dlabola, 1957); Adapazarı, Adıyaman prov.: Kahta, Ađrı prov.: Patnos, Ankara prov.: Çubuk, Diyarbakır prov.: Çermik, Deve geçidi, Lice, Silvan, Elazığ prov.: Karakoçan, Erzincan prov.: Bahçelik ky, Demirpınar, Erzurum prov.: Hasankale, Uzundere, Kars prov.: İđdir-Kllk, Manisa prov.: Grdes, Mardin prov.: Cizre, İdil, Sinop prov.: Kanlıçay, Sivas prov.: Suşehri, Tokat prov.: Erbaa, Trabzon prov.: Derecik, Maçka, Urfa prov.: Ceylanpınar, Harran, Siverek, Van prov.: Van gl (Lodos & Kalkandelen, 1980a); Nevşehir prov.: rgp, Malatya prov.: Balaban, Ađrı, İçel prov.: Erdemli, Ordu prov. (Dlabola, 1981); İçel prov.: Erdemli, Malatya prov.: Balaban, Adana prov., Ankara prov.: Mogan Gl, Beynam (Dlabola, 1994); Afyon prov.: Centre, Balmahmut, Gebeciler, Ankara prov.: Akyurt, Altınova, Kalecik, Dzce prov., Bolu prov.: Gerede, Merkezler, Mudurnu, İnsuyu, Çankırı prov.: Hasakça, Isparta prov.: Eğirdir, Glck, Senirkent, Maraş prov.: Tufanbeyli, Centre, Gksun, Afşin, Muğla prov.: Bodrum, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Rize prov.: Hayrat (Kalkandelen, 2000); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Finike (Dağbağ), İbradı (zmdere), Kale, Manavgat (Demirciler, Hacıobası, Taşaağıl) (Demir, 2007a).

***Hyalesthes thracicus* Hoch, 1985**

Distribution: TR, GR, NE.

Distribution in Turkey: (22, 01).

Adana prov.: Pozantı-Elmalı, Edirne prov.: Keşan (Hoch & Remane, 1985).

***Hyalesthes veyselii* Hoch, 1985**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (14, 07, 42, 51, 65).

Bolu prov., Antalya prov., Konya prov., Niğde prov. (Hoch & Remane, 1985); Van prov.: Güzeldere (Kalkandelen, 2000).

Family: DELPHACIDAE
Subfamily: ASIRACINAE
Tribe: ASIRACINI

Genus: *Asiraca* Latreille, 1796

Synonym: = *Manchookhonia* Kato, 1933

***Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794)**

Distribution: AF, AL, AT, BE, BH, BT, BG, CO, CR, CA, CL, CY, CS, Dosecanese Is., FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, MC, MD, N-AE, PL, PT, RO, S-RU, SA, Sicily, SL, SN, ES, SW, NL, UA, YU, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (05, 07, 34, 06, 09, 19, 20, 25, 35, 42, 43, 48, 55, 57, 66).

İstanbul prov.: Belgrat forest (Fahringer, 1922); Ankara prov.: Çamlıdere, Çorum prov., Denizli prov.: Kale-Tavas, İstanbul prov.: Yalova prov., İzmir prov.: Gümüldür, Konya prov.: Ermenek, Kütahya prov.: Tunçbilek, Samsun prov.: Bafra, Havza, Sinop prov.: Centre, Boyabat, Gerze, Yozgat prov.: Çekerek (Lodos & Kalkandelen, 1980b); Aydın prov.: Söke, Muğla prov.: Fethiye, Ankara prov.: Eymir, Beşevler, Çubuk Barajı, Antalya prov.: Serik, Konya prov.: Ayrancı, Samsun prov.: Kavak (Asche, 1982); Amasya prov.: Centre, Erzurum prov.: Tortum (Güçlü, 1996); Ankara prov.: Ayaş (Akyatak, Sincan Mülk) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Evrnleryavşı) (Demir, 2007a).

Subfamily: KELISIINAE

Genus: *Kelisia* Fieber, 1866

***Kelisia ribauti* Wagner, 1938**

Synonym: = *guttula* auct.

Distribution: AT, AO, BT, BG, CI, CO, CR, CL, CS, DK, DO, EE, FI, FR, DE, GR, HU, LA, LI, ME, N-AE, NO, PL, PT, RO, M-RU, SA, SC, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 09, 10, 13, 20, 21, 25, 30, 42, 44, 56, 65).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Konya prov.: Beyşehir (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk, Gölbaşı, Hasanoğlu, Diyarbakır prov.: Centre, Silvan, Hakkari prov.: Beytüşebap, Siirt prov.: Şirvan, Van prov.: Aliaslan (Lodos & Kalkandelen, 1980b); Ankara prov.: Mogan gölü, Malatya prov.: Balaban (Dlabola, 1981); Aydın prov.: Milet, Büyük Menderes Denizli prov.: Çardak (Asche, 1982); Erzurum prov.: Aşkale, Kargapazarı, Oltu, Tortum, Kaledibi, Uzundere, Ulubah, Kireçtaşı (Güçlü, 1996); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Antalya prov.: Akseki (Geriş) (Demir, 2007a).

***Kelisia yarkonensis* Linnavuori, 1962**

Distribution: AT, BG, CY, GR, IL, N-AE, TR, YU, NE.

Distribution in Turkey: (07, 42).

Konya prov.: Ereğli, 15 km S Konya (Asche, 1982); Antalya prov.: Kale (Eseler), Manavgat (Boztepe, Bucakşeyhler) (Demir, 2007a).

Subfamily: DELPHACINAE

Tribe: TROPIDOCEPHALINI

Genus: *Tropidocephala* Stal, 1853

Synonym: = *Conicoda* Matsumura, 1900 = *Ectopiopterygodelphax* Kirkaldy, 1906 = *Nephropsia* A.Costa, 1862 = *Smara* Distant, 1906

***Tropidocephala andropogonis* Horvath, 1895**

Distribution: BG, CS, GR, HU, SL, TR, YU, NE.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).

***Tropidocephala tuberipennis* (Mulsant et Rey, 1855)**

Synonym: = *elegans* O. Costa, 1834.

Distribution: AL, CR, CY, FR, GR, IT, N-AE, SA, SC, ES, YU, AR, NE, N-AC, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 09, 33).

Adana prov.: Misis as *Tropidocephala elegans* Costa, 1834 (Dlabola, 1957); Aydın prov.: Samsundağı, Antalya prov.: Lara, İçel prov.: Silifke, Balandiz (Asche, 1982); Antalya prov.: Kemer, Manavgat (Bucakşeyhler, Hacıobası, Demirciler) (Demir, 2007a).

Tribe: DELPHACINI

Genus: *Eurybregma* Scott, 1875***Eurybregma nigrolineata* Scott, 1875**

Distribution: AT, BO, MV, SL, FR, DE, GB, HU, IT, MN, PL, KG, MD, M-RU, UA, UZ, TR.

Distribution in Turkey: (33, 42).

Konya prov.: Ereğli, İçel prov.: Çamyayla (Asche, 1982).

Genus: *Iubsoda* Nast, 1975***Iubsoda stigmatica* (Melichar, 1897)**

Synonym: = *duffelsi* Dlabola, 1974 = *strigosa* Matsumura, 1910.

Distribution: BI, CR, CA, CY, FR, GR, N-AE, IT, SC, ES, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (31).

Hatay prov.: İskenderun, Teknepinarı (Asche, 1982).

Genus: *Euides* Fieber, 1866

Synonym: = *Euidella* Puton, 1886

***Euides caspiana* (Dlabola, 1961)**

Distribution: S-RU, TR, NE.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Mersin-Silifke (Dlabola, 1971b).

Genus: *Chloriona* Fieber, 1866***Chloriona sicula* Matsumura, 1910**

Synonym: = *flaveola* Lindberg, 1948.

Distribution: AT, BG, CL, CY, EG, FR, DE, GR, IT, KG, MA, N-AE, SC, ES, SW, TR, EP, NE.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 09, 33, 35).

Adana prov. as *Chloriona flaveola* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1957); İçel prov.: Erdemli as *Chloriona flaveola* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1981); Aydın prov.: Milet, İzmir prov.: Küçük Menderes, Ankara prov.: Mogan Gölü, Antalya prov.: Lara as *Chloriona flaveola* Lindb.(Asche, 1982); Antalya prov.: Alanya (Konaklı), Düzlerçamı, Kumluca, Manavgat (Demirciler) as *Chloriona flaveola* Lindberg, 1948 (Demir, 2007a).

***Chloriona ponticana* Asche 1982**

Distribution: CR, CL, GR, LB, MA, N-AE, ES, TR, NE.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Lara (Asche, 1982); Antalya prov.: Gazipaşa (Çalıpınar-Kahyalar) (Demir, 2007a).

Genus: *Laodelphax* Fennah, 1963

Synonym: = *Callidelphax* Wagner, 1963

***Laodelphax striatellus* (Fallen, 1826)**

Synonym: = *akashiensis* Matsumura, 1900 = *devastans* Matsumura, 1900 = *fimbriata* Rey, 1894 = *giffuensis* Matsumura, 1900 = *haupti* Lindberg, 1936 = *lateralis* Fieber, 1879 = *maikoensis* Matsumura, 1900 = *minonensis* Matsumura, 1900 = *nipponica* Matsumura, 1900 = *niveopicta* Haupt, 1927 = *reyana* Metcalf, 1943.

Distribution: AF, AL, DZ, AM, AT, AZ, BE, BH, BT, BG, BI, CN, CO, CR, CA, CL, CS, FI, FR, DE, GR, HU, IR, IQ, IL, IT, JP, KP, KK, LB, LA, LI, MC, ME, MN, MD, N-AE, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, AR, EP, NE, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 02, 06, 07, 13, 21, 24, 25, 33, 35, 36, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 73, 76).

Bitlis-Baykan, Baykan-Silvan, Fevzipaşa-Mersin, Aspendos-Perge, Eskişehir-Bilecik (Dlabola, 1971b); Adıyaman prov.: Besni, Diyarbakır prov., İzmir prov.: Narlıdere, Yalakkdere, Malatya prov.: Hasırclar, Muğla prov.: Milas, Niğde prov.: Ulukışla, Siirt prov.: Şırnak (Lodos & Kalkandelen, 1980b); Ankara prov.: Mogan gölü, Nevşehir prov.: Ürgüp, Malatya prov.: Balaban, İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Adana prov.: Ceyhan, Ankara prov.: Eymir, Mogan Gölü, Çubuk barajı İçel prov.: Silifke (Asche, 1982); Erzurum prov.: Centre, Söğütli, Aşkale, Merdiven, İspir, Ortabahçe, Özbağ, Narman, Kireçli, Oltu, Balıca, Dağdibi, Tuzluca, Olur, Palandöken, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum, Kaledibi, Erzincan prov.: Centre, Ankara prov.: Centre, Bitlis prov.: Centre, Kireçtaşı, Iğdır prov.: Centre, Küllük, Erdemli, Maraş prov.: Afşin, Centre, Kars prov.: Centre, Çıldır, Ordu prov.: Centre, Gülyalı, Ünye, Turnasuyu, Rize prov.: Centre (Güçlü, 1996); Antalya prov.: Alanya (Obaköy), Elmalı (Akçay), Finike (Turunçova), Gazipaşa (Macarköy), Kemer (Böğürtlenözü, Centre, Çamyuva), Güllükdağı, Korkuteli (Datköy), Kale (Köşkerler), Kaş (Kalkan, Üzümlü), Kumluca (Kavakdibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Centre, Demirciler), Serik (Aspendos, Köprüçayı, Camili) (Demir, 2007a).

Genus: *Leptodelphax* Haupt, 1927***Leptodelphax cyclops* Haupt, 1927**

Distribution: CY, DO, SC, AR, TR, NE.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: 15 km E Mersin (Asche, 1982).

Genus: *Sogatella* Fennah, 1956

Synonym: = *Sogatodes* Fennah, 1963

***Sogatella vibix* (Haupt, 1927)**

Synonym: = *catoptron* Fennah, 1963 = *diachenhea* Kuoh, 1977 = *dogensis* Ishihara, 1952 = *furcata* Matsumura, 1910 = *longifurcifera* Esaki & Ishihara, 1947 = *matsumurana* Metcalf, 1943 = *panicicola* Ishihara, 1949 = *parakolophon* Linnavuori, 1973.

Distribution: CR, CL, CY, GR, N-AE, SC, UA, AR, AS, EP, NE, N-AC, OR, AF, TR.

Distribution in Turkey: (02, 05, 06, 07, 09, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 42, 70, 47, 50, 56, 63, 65).

Baykan-Silvan, Diyarbakır-Siverek, Bitlis-Reşadiye, Reşadiye-Tatvan, Bitlis-Baykan, Tatvan-Bitlis, Silifke-Işıkli, Silifke-Mamura (Dlabola, 1971b); Tahir, Gevaş, Van gölü, İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Aydın prov.: Samsundağı, Ankara prov.: Mogan Gölü, Hatay prov.: İskenderun, Teknepinarı, İçel prov.: Silifke, Kızkalesi (Asche, 1982); Erzurum prov.: Aşkale, Küçükgeçit, Oltu, Dağdibi, Pasinler, Porsuk, Tortum (Güçlü, 1996); Antalya prov.: Alanya (Konaklı), Aksu (Topallar), Finike (Yeşilyurt, Erenkavak), Gazipaşa (Asarcık, Çalpınar-Kahyalar), Kale (Eseler), Kemer (Böğürtlenözü, Centre), Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Manavgat (Bucakşeyhler, Çakış, Örenşehir, Taşağul, Kilimli, Ilica, Demirciler), Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

Genus: *Muirodelphax* Wagner, 1963

Synonym: = *Delphacinoidea* Vilbaste, 1965

***Muirodelphax aubei* (Perris, 1857)**

Synonym: = *altaicus* Vilbaste, 1965 = *cognata* Fieber, 1866 = *obscuripennis* Kirschbaum, 1868 = *protrusa* Fieber, 1866.

Distribution: AT, BE, BT, BG, CL, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, PL, PT, RO, S-RU, SA, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 20, 25, 35, 65).

Ankara prov.: Beynam as *Calligypona aubei* Perris, 1857 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı II, Karagöl, Lalahan, Erzurum prov.: Tufanç köyü, İzmir prov.: Ödemiş-Bozdağ (Lodos & Kalkandelen, 1980b); Van prov.: Başkale (Dlabola, 1981); Denizli prov.: Çardak (Asche, 1982); Erzurum prov.: Centre, Narman, Oltu, Ballica, Pasinler, Çögönder, Tortum (Güçlü, 1996); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Yukançanlı) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Elmalı (Çıglıkara) (Demir, 2007a).

Genus: *Horvathianella* Anufriev, 1980

***Horvathianella palliceps* (Horvath, 1897)**

Distribution: AT, BG, CA, CS, GR, HU, IT, RO, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Güzeloluk (Asche, 1982).

Genus: *Falcotoya* Fennah, 1969

***Falcotoya minuscula* (Horvath, 1897)**

Distribution: AF, AM, BG, EG, FR, GR, HU, IR, IQ, IT, KG, RO, RU, SL, ES, SW, TJ, TR, UA, YU.

Distribution in Turkey: (01, 06, 09, 24, 25, 33, 76).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Adana prov.: Kozan, Bürücek as *Calligypona minuscula* Horvath, 1897 (Dlabola, 1957); Aydın prov.: Milet, İzmir prov.: Küçük Menderes (Asche, 1982); Erzurum prov.: Yeşilyayla, Hıms, Horasan, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum, Erzincan prov.: Altıntepe, Iğdır prov.: Centre (Güçlü, 1996).

Genus: *Toya* Distant, 1906

Synonym: = *Metadelphax* Wagner, 1963

***Toya propinqua* (Fieber, 1866)**

Synonym: = *cataniae* Matsumura, 1910 = *hamatula* Kirschbaum, 1868 = *marshalli* Scott, 1873 = *shirozui* Ishihara, 1949 = *subfusca* Muir, 1919 = *terminalis* Van Duzee, 1907 = *tuckeri* Van Duzee, 1912.

Distribution: AF, AL, AT, BH, BG, CI, CO, CR, CA, CL, CY, CS, FR, DE, GR, HU, IT, MC, MD, N-AE, PL, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SW, UA, YU, AR, EP, NE, NA, NR, N-AC, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 05, 06, 07, 09, 17, 20, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 47, 48, 52, 55, 56, 57).

Adana prov.: Kozan, Karataş, Misis, Gavur Dağı, Centre, Ankara prov.: Beynam, Hasanoğlan, İçel prov.: Alata, Alahan as *Calligypona propinqua* Fieber, 1866 (Dlabola, 1957); Hatay prov.: İskenderun (Linnavuori, 1965), Silifke-Mamura, Silifke-Işıkli, Aspendos-Perge, Keçiborlu-İzmir (Dlabola, 1971b); Amasya prov.: Osmancık, Taşova, Diyarbakır prov.: Centre, Pirlaçlık, Gaziantep prov.: Güneriz, Kastomonu prov.: Tosya, Mardin prov.: Cizre, İdil, Silopi, Siirt prov.: Şirvan, Sinop prov.: Boyabat (Lodos & Kalkandelen, 1980b); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Aydın prov.: Milet, Büyük Menderes, Akköy, Kuşadası, Söke, Samsundağı, Çanakkale prov.: Korudağ, Truva, Denizli prov.: Pamukkale, Muğla prov.: Fethiye, Antalya prov.: Lara, Finike, Elmalı, Gündoğmuş, Hatay prov.: İskenderun, Teknepmarı, İçel prov.: Silifke, Palantepe, Mut, Köseleri, Keben, Samsun prov.: Kavak, Sinop prov.: Yakakent, Gerze (Asche, 1982); Hatay prov.: İskenderun as *Calligypona propinqua* Fieb. (Linnavuori, 1965); Erzurum prov.: Oltu, Dağdibi, Tuzluca, Ordu prov.: Korgan (Güçlü, 1996); Antalya prov.: Alanya (Konaklı, Obaköy, Okurealar), Gazipaşa (Asarcık), Finike (Turunçova), Kumluca (Kavakköy), Kale (Eseler), Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Kemer (Centre, Karabucak), Manavgat (Bucakseyhler, Belenobası, Beşkonak, Centre, Demirciler, Hacıobası), Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

Toya obtusangula* (Linnavuori, 1957)*Distribution:** CO, CY, GR, IT, ES, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Finike (Asche, 1982).

Toya ibiturca* Asche, 1980*Distribution:** GR, ES, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (33).

İçel prov.: Silifke (Asche, 1982).

Genus: *Pseudaraeopus* Kirkaldy, 1904Synonym: = *Geoneossus* Muir, 1913***Pseudaraeopus lethierryi* (Mulsant et Rey, 1879)****Synonym:** = *ribauti* Lallemand, 1921.**Distribution:** CI, CR, CA, CL, CY, FR, GR, IT, ME, N-AE, SC, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 09).

Aydın prov.: Milet (Asche, 1982); Antalya prov.: Düzlerçamı, Finike (Erenkavak), Gazipaşa (Çalpinar-Kahyalar, Macarköy), Kemer (Olympos National Park), Manavgat (Bucakşeyhler, Örenşehir) (Demir, 2007a).

Genus: *Javesella* Fennah, 1963***Javesella* (s. str.) *pellucida* (Fabricius, 1794)****Synonym:** = *bilineata* Metcalf, 1943 = *dispar* Fallen, 1806 = *flavipennis* Sahlberg, 1871 = *flavotestacea* Metcalf, 1943 = *frontalis* Kirschbaum, 1868 = *fuscicollis* Rey, 1891 = *griseaflava* Metcalf, 1943 = *herrichii* Kirschbaum, 1868 = *marginata* Fabricius, 1794 = *obscura* Fieber, 1879 = *ochroleuca* Kirschbaum, 1868 = *stenegeri* Ashmead, 1899 = *striata* Fabricius, 1794 = *suturalis* Curtis, 1837 = *testacea* Metcalf, 1943 = *varicollis* Rey, 1891.**Distribution:** AT, DZ, BE, BG, BH, BT, BG, CA, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IC, IE, IT, KG, KK, LB, LA, LI, MC, MA, MD, NL, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 13, 21, 25, 42, 46, 57, 65).Ankara prov.: Mogan Gölü, Hasanoğlan as *Calligypona pellucida* Fabricius, 1794 (Dlabola, 1957); Diyarbakır prov., Konya prov.: Durağan (Lodos & Kalkandelen, 1980b); Van prov.: Gevaş, Van gölü (Dlabola, 1981); Erzurum prov.: Söğütlü, Centre, Mürdümük, Aşkale, Merdiven, Hınıs, Horasan, İspir, Narman, Dağdibi, Palandöken, Tortum, Kaledibi, Bitlis prov.: Kireçtaşı, Maraş prov.: Afşin (Güçlü, 1996); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Yenimahalle) (Demir, 2007b).***Javesella* (s. str.) *salina* (Haupt, 1924)****Synonym:** = *juncea* Haupt, 1935.**Distribution:** BG, CS, EE, DE, HU, LI, PL, SL, SE, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06).Ankara prov.: Mogan Gölü, Adana prov.: Abacılar as *Calligypona salina* Haupt, 1924 (Dlabola, 1957).**Genus: *Delphacodoides* Muir, 1929**Synonym: = *Alatades* Dlabola, 1957***Delphacodoides anaxarchi* (Muir, 1926)****Synonym:** = *ornata* Muir, 1929 = *trilineus* Dlabola, 1957.**Distribution:** N-AE, AR, NE, IL, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 33).İçel prov.: Alata *Alatades trilineus* sp.n. (Dlabola, 1957); İçel prov.: Erdemli as *Alatades trilineus* Dlabola, 1957 (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Lara *Alatades trilineus* Dlab. (Asche, 1982); Antalya prov.: Alanya (Kargıcak), Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler), Serik (Camili) (Demir, 2007a).

Genus : *Perkinsiella* Kirkaldy, 1903

Synonym: = *Araeopides* Ribaut, 1948

***Perkinsiella dorsata* Melichar, 1905**

Synonym: = *insignis* Distant, 1912 = *picta* Ribaut, 1948.

Distribution: AF, CY, AR, NE, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 33).

Adana prov. as *Araeopides pictus* Ribaut, 1948 (Dlabola, 1957); İçel prov.: Erdemli as *Perkinsiella insignis* (Distant, 1912) (Dlabola, 1981); İçel prov.: Silifke (Asche, 1982); Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Aksu (Topallar), Kemer (Çamyuva), Manavgat (Centre, Demirciler, Karaöz) (, Demir, 2007a).

Genus: *Calligypona* Sahlberg, 1871***Calligypona reyi* (Fieber, 1866)**

Synonym: = *albicollis* Sahlberg, 1871 = *longipes* Kirschbaum, 1868 = *sahlbergiana* Ishihara, 1949.

Distribution: AT, BE, BH, BT, BG, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, MC, MN, MA, PL, RO, N-RU, SL, ES, SE, NL, TJ, UZ, EP, TR.

Distribution in Turkey: (46).

Maraş prov.: Elbistan (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Family: MEENOPLIDAE

Subfamily: MEENOPLINAE

Genus: *Meenoplus* Fieber, 1866***Meenoplus albosignatus* Fieber, 1866**

Distribution: BG, CY, GR, IT, YU, NE, IL, JO, TR, Caucasus.

Distribution in Turkey: (02, 06, 07, 10, 14, 30, 44, 47, 49).

Ankara prov.: Baraj, Ayaş, Gaziantep prov. (Dlabola, 1957); Ankara prov., Bolu prov.: Gerede (Linnavuori, 1965); Adyaman prov.: Gerger, Kahta, Ankara prov.: Lalahan, Hakkari prov.: Çukurca, Mardin prov.: Derik, Midyat, Muş prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Malatya prov.: Balaban as *Meenoplus albostratus* Fieber, 1866; Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Güllükağaç, Gündoğmuş (Serinyaka), Gazipaşa (Macarköy), İbradı (Başlar) (Demir, 2007a).

Subfamily: KERMESIINAE

Genus: *Nisia* Melichar, 1903***Nisia nervosa* (Motschulsky, 1863)**

Synonym: = *atrovenosus* Lethierry, 1888

Distribution: GR, SC, AR, AS, EP, NE, N-AC, OR, TR.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).

Family: DERBIDAE

Subfamily: DERBINAE

Tribe: CENCHREINI

Genus: *Malenia* Haupt, 1924***Malenia bosnica* Horvath, 1907 (FLOWda *Cedusa* cinsine dahil)**

Synonym: = *turanica* Anufriev, 1966.

Distribution: AF?, CY, SC, RO, AZ, UA, YU TJ, TR, UZ.

Distribution in Turkey: (06, 07, 47, 48).

Mardin prov.: Ömerli (Dlabola, 1977); Ankara prov.: Nallıhan, Antalya prov.: Kaş, Saklıkent, Muğla prov.: Köyceğiz (Lodos & Kalkandelen, 1988).

***Malenia kilisica* Dlabola, 1986**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (79).

Kilis prov. (Dlabola, 1986).

Family: ACHILIDAE

Subfamily: ACHILINAE

Tribe: ACHILINI

Genus: *Cixidia* Fieber, 1866

Synonym: = *Elidiptera* auct. = *Epiptera* Metcalf, 1922 = *Helicoptera* Amyot et Serville, 1843

***Cixidia mersinica* Dlabola, 1987**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 27, 33, 42, 48).

İçel prov.: Mut, Silifke, Gaziantep prov.: Araban, Adana prov.: Karaisalı, Konya prov.: Ermenek, Muğla prov.: Bodrum, Köyceğiz (Dlabola, 1987).

***Cixidia pilatoi* D'Urso & Guglielmino 1995**

Synonym: = *marginicollis* auct.

Distribution: AT, BH, BG, CS, DE, IT, MD?, RO, SW?, UA?, YU, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07).

Adana prov.: Pozantı as *Epiptera marginicollis* Spin. (Linnavuori, 1965); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

Tribe: PLECTODERINI

Genus: *Akotropis* Matsumura, 1914

Synonym: = *Ballonymus* Jacobi, 1941

***Akotropis quercicola* Linnavuori, 1962**

Distribution: BG, GR, TR, NE.

Distribution in Turkey: (31, 43).

Hatay prov.: Yayladağı (Linnavuori, 1965); Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981).

Family: DICTYOPHARIDAE

Subfamily: DICTYOPHARINAE

Genus: *Callodictya* Melichar, 1912

***Callodictya krueperi* (Fieber, 1876)**

Distribution: BG, CA, GR, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 31, 35, 62).

İzmir prov.: Kiraz, Tunceli prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Antalya prov.: Akseki (Murtıçı), Gündoğmuş (Çiekoluk), İbradı (Başlar), Kaş (Kemerköy, Dirgenler), Manavgat (Demirciler), Serik (Sarıbahı) (Demir, 2007a).

Genus: *Dictyophara* Germar, 1833

Synonym: = *Avephora* Bierman, 1910 = *Chanitus* Kolenati, 1857 = *Pseudophana* Burmeister, 1835

Dictyophara (s.str.) asiatica* Melichar, 1912*Distribution:** CY, NE, IL, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 54, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 24, 32, 35, 39, 43, 45, 48, 59, 63, 65, 71).

Ankara prov.: Baraj, Adana prov.: Bürücek, Toros (Dlabola, 1957); Amasya prov., Aydın prov.: Germencik, Balıkesir prov.: Susurluk, Bilecik prov.: Gölpaazarı, Bolu prov.: Mengen, Burdur prov., Denizli prov., Diyarbakır prov.: Silvan, Elazığ prov., Eskişehir prov.: Laçın, Erzincan prov.: Bahçelikköy, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Bornova, Ödemiş, Torbalı-Ayrancılar, Kırklareli prov.: Vize, Manisa prov.: Centre, Gördes, Muğla prov.: Fethiye-Seki, Tekirdağ, Urfa prov.: Hilvan, Van prov.: Edremit (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Tunceli prov.: Hozat, 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), Alanya (Kargıcak, Obaköy), Gündoğmuş (Çiçekoluk), Güllükdağı, Hisarçandır, Kemer (Çamyuva, Olympos National Park, Sarıçınardağı), Kaş (Beldibi, Dirgenler), Manavgat (Bucakşeyher, Demirciler, Hacıobası), Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

Dictyophara (s.str.) europaea* (Linnaeus, 1767)*Synonym:** = *italica* Kirschbaum, 1868 = *lutea* Lang, 1942 = *aeuropaea* Petagna, 1787 = *europa* Aucher-Elroy, 1826 = *europaea* Ludwig, 1799.**Distribution:** AL, AT, BE, BG, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MD, PL, PT, RO, S-RU, SA, SC, ES, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 45, 48, 49, 52, 55, 56, 65, 76).

Ankara prov.: Çubuk, Karagöl, Lalahan, Denizli prov.: Çardak, Diyarbakır prov.: Centre, Çermik, Eskişehir prov.: Laçın, Isparta prov.: Eğridir, İstanbul prov.: Silivri, İzmir prov.: Narlıdere, Tire, Torbalı-Ayrancılar, Iğdır prov., Kastamonu prov.: Tosya, Manisa prov.: Salihli, Muğla prov.: Centre, Fethiye, Yatağan, Muş prov., Ordu prov.: Kumru, Samsun prov., Siirt prov.: Kozluk, Şırnak, Van prov.: Muradiye (Lodos & Kalkandelen, 1980c).

Dictyophara (s.str.) lindbergi* Metcalf, 1955*Synonym:** = *acuminata* Lindberg, 1948.**Distribution:** BG, CY, IT, ES, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 35, 43, 48, 59).

Adana prov.: Gavur Dağı *Dictyophara acuminata* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1957); İzmir prov.: Bornova, Mordoğan, Narlıdere, Tire, Torbalı-Ayrancılar, Kütahya prov.: Simav, Muğla prov.: Fethiye, Milas, Tekirdağ prov.: Hayrabolu, Pehlivan köy (Lodos & Kalkandelen, 1980c). Antalya prov.: Akseki (Güneykaya), Güllükdağı, Manavgat, Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

Dictyophara iranica* Linnavuori, 1962*Distribution:** IR, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 56).

Siirt prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Antalya prov.: Manavgat (Boztepe, Taşağıl), Serik (Aspendos, Köprüçay) (Demir, 2007a).

Dictyophara (Euthremma) multireticulata* Mulsant et Rey, 1855*Synonym:** = *heydenii* Kirschbaum, 1868 = *curvata* Matsumura, 1910 = *nemourensis* Matsumura, 1910 = *oertzeni* Matsumura, 1910.**Distribution:** AL, AT, BG, FR, GR, HU, IT, MD, PT, RO, S-RU, SC, SL, ES, UA, YU, NE TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 20, 65).

Denizli prov.: Kale, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Aköz) (Demir, 2006b); Antalya prov.: İbradı (Başlar) (Demir, 2007a).

Dictyophara (Chanithus) xiphias* Puton, 1884*Distribution:** IL, JO, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 35).

İzmir prov.: Beydağ (Lodos & Kalkandelen, 1980c), Antalya prov.: Gündoğmuş (Çiçekoluk), Gazipaşa (Macarköy), Güllükdağı, Manavgat (Bucakşeyher, Demirciler) (Demir, 2007a).

Family: TROPIDUCHIDAE
Subfamily: TROPIDUCHINAE
Tribe: TRYPETIMORPHINI

Genus: *Trypetimorpha* Costa, 1862

***Trypetimorpha occidentalis* Huang et Bourgoïn, 1993**

Synonym: = *fenestrata* auct.

Distribution: AT, CI, CY, FR, IT, ES, YU, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07).

Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı as *Trypetimorpha fenestrata* A.Costa, 1862 (Demir, 1998); Antalya prov.: Düzlerçamı (Demir, 2007a).

Family: TETTIGOMETRIDAE

Genus: *Tettigometra* Latreille, 1804

***Tettigometra (Hystriagonia) hexaspina* Kolenati, 1857**

Synonym: = *callosa* Signoret, 1866 = *hispidula* Fieber, 1865.

Distribution: BG, GR, ES, IT, PT, RO, S-RU, UA, YU, NE, IL, JO, TR, AM, GG.

Distribution in Turkey: (04, 06, 07, 24, 25, 27, 28, 32, 36, 59, 63).

Ankara prov.: Baraj, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Ağrı prov.: Hamur, Ankara prov.: Çubuk Barajı II, Elmadağ, Eymir gölü, Gaziantep prov.: Nizip, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Isparta prov.: Eğridir, Tekirdağ prov., Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Erzincan prov.: Yukarı Çakırman, Erzurum prov.: Oltu, Kars prov.: Kağızman (Güçlü, 1997); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası, Söğütçük) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (Metroplaca) longicornis* (Signoret, 1866)**

Distribution: CA, FR, GR, IT, RO, S-RU, SC, SW?, YU, EP, NE, AF, DZ, TR, AM, AZ, KG, TJ, TM, UZ.

Distribution in Turkey: (06, 07, 22, 58).

Ankara prov.: Baraj, Beynam, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Sivas prov.: Gürün as *Micrometrina longicornis* Signoret, 1866 (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Yasin) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası), Manavgat (Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (Mitricephalus) eremi* Lindberg, 1948**

Distribution: AF, S-RU, UA, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 09, 15, 17, 35, 45, 64).

Ankara prov.: Çubuk Barajı I, Eymir, Lalahan, Aydın prov.: Mardin, Burdur prov.: Yeşilova, Çanakkale prov.: Gelibolu-Bolayır, İzmir prov.: Tire, Manisa prov.: Kula, Uşak prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Sapanca gölü, Pınarbaşı, Sivas prov.: Gürün, Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Bağlum, Konya prov.: Bozkır (Güçlü, 1997); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Yasin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (İdrisdağı) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Güllükdağı, Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası), Manavgat (Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (Mitricephalus) leucophaea* (Preyslser 1792)**

Synonym: = *obliqua* Panzer, 1799.

Distribution: AL, AT, BE, BG, CS, E-TR, FR, DE, ES, HU, IT, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, SA, SC, SL, ES, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 14, 34, 02, 04, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 35, 47, 50, 58, 59, 63).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam, Edirne, Adana prov.: Bürücek, Toros, Tapan, Gavur Dağı, Mollafeneri as *Tettigometra obliqua* Panzer, 1799 (Dlabola, 1957); Ankara prov., Bolu prov., Silivri as *Tettigometra obliqua* Pan. (Linnavuori, 1965); Adıyaman prov.:

Kahta, Ağrı prov.: Hamur, Ankara prov.: Çubuk Barajı I, Çubuk Barajı II, Çubuk, Karagöl, Eymir gölü, Kayaş, Lalahan, Bilecik prov., Burdur prov., Çanakkale prov.: Bayramiç, Çankırı prov.: Ilgaz, Çorum prov.: Dodurga, İskilip, Diyarbakır prov., Elazığ prov.: Karakoçan, İzmir prov.: Tire, Mardin prov.: Midyat, Nevşehir prov.: Göreme, Sivas prov.: Koyulhisar, Tekirdağ prov.: Centre, Şarköy, Urfa prov. (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Salin, Yasin) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Çamlıdere (Demir, 2007b); Antalya prov.: Elmalı (Çıglıkara), İbradı (Başlar), Korkuteli (Sögütcük) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (s. str.) sulphurea* Mulsant et Rey, 1855**

Distribution: AT, CY, FR, GR, HU, IT, MD, S-RU, ES, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 21, 23, 35, 43, 50, 54, 63, 64, 65).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam, Adana prov.: Karataş, Mollafeneri, Gavur Dağı, Tapan (Dlabola, 1957); Artvin prov., Aydın prov.: Mardan, Samsun dağı, Bilecik prov.: Gölpaşarı, Söğüt, Bursa prov.: Yenişehir, Diyarbakır prov., Elazığ prov.: Hazar gölü, İzmir prov.: Bornova, Ödemiş, Kütahya prov.: Tavşanlı, Nevşehir prov.: Centre, Bağcılık İst., Sakarya prov.: Geyve, Urfa prov.: Suruç, Uşak prov.: Banaz, Van prov.: Centre-Muradiye (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Manavgat (Belenobasi, Bucakşeyhler, Seleukeia) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (s. str.) virescens* (Panzer, 1799)**

Synonym: = *dorsalis* Latreille, 1804.

Distribution: AT, BE, CS, FR, DE, GR, HU, IT, LA?, PL, PT, RO, SA, SC, SL, ES, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 02, 06, 08, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 76, 47, 62, 63, 65).

Bursa prov.: Uludağ (Fahringer, 1922); Gülek, Hatay prov.: Yayladağı-Belen (Linnavuori, 1965); Adıyaman prov.: Samsat, Ankara prov.: Çubuk Barajı II, Eymir gölü, Diyarbakır prov.: Devegeçidi, Silvan, Elazığ: Palu, Erzincan prov.: Kemaliye, Gaziantep prov.: Centre-Çağdın, Iğdır prov., Mardin prov.: Nusaybin, Tunceli prov.: Pülümür, Urfa prov.: Hilvan, Siverek, Suruç, Van prov.: Gürpınar-Kırkeçit (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Artvin prov.: Ardanuç, Denizli prov.: Çal, Erzincan prov.: Aydoğdu, Cevizli, Üzümlü, Erzurum prov.: Oltu, Pazaryolu, İspir, Iğdır prov.: Çalpala (Güçlü, 1997); Antalya prov.: Kemer (Ovacık) (Demir, 2007a).

***Tettigometra (Stirometra) costulata* Fieber, 1865**

Synonym: = *heydenii* Kirschbaum, 1868 = *parviceps* Signoret, 1866.

Distribution: AF, GR, IT, PT, S-RU, SC, ES, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 02, 08, 12, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 76, 44, 47, 56, 63, 65).

Elazığ prov.: Dizönü, Akkoyak, Diyarbakır-Araz, Mardin-Ömerli (Dlabola, 1977); Adana prov.: Çukurova, Adıyaman prov.: Gerger, Kahta-Narince, Nemrut, Bingöl prov.: Solhan, Diyarbakır prov.: Centre, Çermik, Çüngüş, Silvan, Elazığ prov.: Düzönü, Hazar gölü, Karakoçan, Palu, Erzincan prov.: Gaziantep prov.: Centre, Battal köyü, Araban, Güneriz, Nizip, Oğuzeli, Hakkari prov.: Centre, Çukurca, Iğdır prov., Malatya prov.: Hekimhan, Mardin prov.: Centre, Derik, Mazıdağı, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli, Siirt prov.: Centre, Kozluk, Urfa prov.: Siverek, Van prov.: Edremit (Lodos & Kalkandelen, 1980c); Artvin prov.: Yusufeli, Sebzeciler, Erzincan prov.: Üzümlü, Bayırbağ, Diyarbakır prov.: Silvan, Erzurum prov.: Narman, Taşlıköy, Kars prov.: Kağızman (Güçlü, 1997).

FAMILY: CALISCELIDAE

Subfamily: CALISCELINAE

Tribe: CALISCELINI

Genus: *Bruchoscelis* Melichar, 1906

***Bruchoscelis peculiaris* (Horvath, 1904)**

Distribution: BG?, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 66).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam (Dlabola, 1957); Yozgat prov.: Çayıralan (Kartal, 1985b); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

Subfamily: OMMATIDIOTINAE

Tribe: OMMATIDIOTINI

Genus: *Ommatidiotus* Spinola, 1839

***Ommatidiotus iranicus* Horvath, 1905**

Distribution: IR, TR.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).

***Ommatidiotus longiceps* Puton, 1896**

Synonym: = *alternans* Horvath, 1916 = *falleni* Bolivar & Chicote, 1879 *longicipiti* Horvath, 1916.

Distribution: AL, CY, GR, PT, ES, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 21, 47, 63).

Diyarbakır prov.: Çınar, Mardin prov.: Silopi, Urfa prov.: Siverek (Lodos & Kalkandelen, 1988); Antalya prov.: Serik (Dikmen) (Demir, 2007a).

Family: ISSIDAE

Subfamily: ISSINAE

Tribe: ISSINI

Subtribe: HYSTEROPTERINA

Genus: *Mycterodus* Spinola, 1839

***Mycterodus bicornutus* Dlabola, 1986**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 31).

Araban, Hatay prov.: Yayladağ, Adana prov.: Gavur dağ (Dlabola, 1986).

***Mycterodus (s. str.) intricatus* Stal, 1861**

Synonym: = *jaltaicus* Dlabola, 1958.

Distribution: CY, S-RU, UA, NE, TR.

Distribution in Turkey: (31).

Hatay prov.: İskenderun, Yayladağı (Linnavuori, 1965).

***Mycterodus (s. str.) lodosicus* Dlabola, 1980**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya: Güllükdağı (Demir, 2007a).

***Mycterodus muticus* Dlabola, 1986**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07, 18, 33).

İçel prov.: Mut, Anamur, Antalya prov., Çankırı prov.: Ilgaz (Dlabola, 1986).

***Mycterodus osmanicus* Dlabola, 1971**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (80).

Osmaniye prov.: Nur dağ, Osmaniye (Dlabola, 1971a).

***Mycterodus pozanticus* Kartal, 1983**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Pozantı-Karasivri (Kartal, 1983):

Mycterodus (Comporodus) spinicordatus* Dlabola, 1983*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Gündoğmuş, Akseki (Dlabola, 1983); Antalya prov.: Gündoğmuş (Güneycik), Gazipaşa (Kahyalar), Manavgat (Beşkonak, Köprülü Kanyon) (Demir, 2007a).

Mycterodus (Comporodus) tekneticus* (Dlabola, 1982)*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Alanya Tekne (Dlabola, 1982); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya, Güçlüköy), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik), Kemer (Ovacık), Manavgat (Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

Genus: *Tshurtshurnella* Kusnezov, 1927Synonym: = *Megissus* Linnavuori, 1965***Tshurtshurnella acutus* (Linnavuori, 1965)****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (31).

Hatay prov.: Yayladağ (Linnavuori, 1965).

Tshurtshurnella adana* Dlabola, 1986*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Tekir (Dlabola, 1986).

Tshurtshurnella alanyana* Dlabola, 1982*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Alanya Tekne (Dlabola, 1982); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Alanya (Keşefli), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik), Güllükdağı, İbradı (Başlar), Hisarçandır, Kemer (Sarçınardağı), Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler, Taşağıl, Kilimli) (Demir, 2007a).

Tshurtshurnella aschei* Kartal, 1985*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Pozantı, Elmalı Boğazı, Bozarmut (Kartal, 1985a).

Tshurtshurnella bicornuta* Dlabola, 1983*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Gündoğmuş, Alanya, Manavgat (Dlabola, 1983).

Tshurtshurnella bozarmutica* Kartal, 1985*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Adana: Pozantı, Elmalı Boğazı, Bozarmut (Kartal, 1985a).

Tshurtshurnella campestre* (Lindberg, 1948)*Distribution:** CY, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 51).

Adana prov.: Pozantı, Niğde prov.: Ulukışla (Linnavuori, 1965).

Tshurtshurnella longispinosa* (Linnavuori, 1962)*Distribution:** CY, IL, TR**Distribution in Turkey:** (01, 80).

Adana prov.: Ceyhan, Osmaniye prov.: Kızıldere, Zorkun (Kartal, 1985a).

Tshurtshurnella trifasciata* (Linnavuori, 1965)*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (02, 21, 31, 33, 65).

Hatay prov.: Yayladağ-Belen (Linnavuori, 1965), Adıyaman prov.: Samsat, Diyarbakır prov., Van prov. (Lodos & Kalkandelen, 1981a); İçel prov.: Çamlıyayla, Kadıncık,, Tarsus, Gürlü Köy (Kartal, 1985a); Hatay prov.: Arsus, Yayladağı, Kırıkhan, İskenderun, Adana prov.: Karatepe (Dlabola, 1986).

Tshurtshurnella ventricornis* Dlabola, 1986*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (46).

Kahramanmaraş prov.: Göksun (Dlabola, 1986).

Genus: *Webbisanus* Dlabola, 1983***Webbisanus ochreicolor* Dlabola, 1983****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (33).

İçel prov.: Centre-Silifke, Sapahili (Dlabola, 1983).

Genus: *Latematium* Dlabola, 1979***Latematium cingulatum* Dlabola, 1983****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07, 43).

Antalya prov.: Korkuteli, Doyran, Söğüt, Seki, Kütahya prov.: Gediz (Dlabola, 1983); Antalya prov.: Çıglık, Güllükdağı, Manavgat (Beşkonak, Köprülü Kanyon) (Demir, 2007a).

Genus: *Bubastia* Emeljanov, 1975Synonym: = *Aeluropsis* Emeljanov, 1971***Bubastia (Acrestia) ephialtes* (Linnavuori 1971)****Distribution:** CY, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (31, 33).Hatay prov.: Yayladağ-Belen, İskenderun (Linnavuori, 1965); İçel prov.: Erdemli as *Hysteropterum ephialtes* Linnavuori, 1971 (Dlabola, 1981).***Bubastia (s.str.) suturale* (Fieber, 1877)****Distribution:** GR, PT?, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 31, 15, 35, 48).Adana prov.: Bürücek, Tapan, Gavur Dağı *Hysteropterum suturale* Fieber, 1877 (Dlabola, 1957); Hatay prov.: İskenderun, Yayladağ-Belen (Linnavuori, 1965), Burdur prov.: Gölhisar, İzmir prov.: Ödemiş-Erikli, Muğla prov.: Fethiye-Seki (Lodos & Kalkandelen, 1981a); Antalya prov.: Çıglık, Düzlerçamı, Güllükdağı, İbradı prov. (Akşahap-İbradı), Kaş (Kemerköy), Kemer (Çamyuva, Ovacık), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Köprülü Kanyon) (Demir, 2007a).

Genus: *Quadrastylum****Quadrastylum jahjai* Dlabola, 1983****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Kumluca (Dlabola, 1983).

Quadrastylum tarsusanum* Dlabola, 1989*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (33).

İçel prov.: Tarsus (Dlabola, 1989).

Genus: *Latilica* Emeljanov, 1971Synonym: = *Dalmatium* Dlabola, 1980***Latilica antalyica* (Dlabola, 1986)****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Varsak, Cennet, Kekova, Sineklibeli, Olympus, Kemer, Finike, Manavgat, Hatay prov.: Dörtöl, Soğukoluk (Dlabola, 1986); Antalya prov.: Kaş (Kemerköy) (Demir, 2007a).

Latilica maculipes* (Melichar 1906)*Synonym:** = *issifrons* Bergevin, 1918 = *maroccanum* Lethierry, 1877 = *oertzeni* Matsumura, 1910.**Distribution:** CA, CY, FR, GR, IT, ES, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 31, 45, 48).

Hatay prov.: Yayladağ-Belen (Linnavuori, 1965), Antalya prov.: Alanya, Osmaniye (Dlabola, 1971a); Manisa prov.: Gölarmara, Gördes, Kula, Muğla prov.: Fethiye, Güllük, Marmaris (Lodos & Kalkandelen, 1981a); Antalya prov.: Gündoğmuş (Dlabola, 1986); Antalya prov.: Gündoğmuş (Çiçekoluk), İbradı (Başlar), Manavgat (Demirciler), Serik (Sarıbalı) (Demir, 2007a).

Latilica quercus* (Lindberg, 1948)*Distribution:** CY, TR.**Distribution in Turkey:** (07).Antalya prov.: Saklıkent as *Kovacsiana quercus* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1989); Antalya prov. (Lodos & Kalkandelen, 1988); Antalya prov.: Hisarçandır, Kemer (Çamyuva) as *Latilica oertzeni* Matsumura, 1910 (Demir, 2007a).***Latilica retamae* (Linnavuori, 1962)****Distribution:** IL, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Olympos, Saklıkent (Lodos & Kalkandelen, 1988); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

Genus: *Libanissum* Dlabola, 1980***Libanissum talhouki* (Dlabola, 1974)****Distribution:** CY, GR, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (33).

İçel prov. (Dlabola, 1974).

Subtribe: ISSINA**Genus: *Issus* Fabricius, 1803**Synonym: = *Archissus* Sergel, 1986

Issus lauri* Ahrens, 1814*Synonym:** = *climacus* Fieber, 1876.**Distribution:** AL, CO, FR, GR, IT, PT, SC, ES, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (31).

İçel prov. (Lodos & Kalkandelen, 1988)

Subtribe: AGALMATIINA**Genus: *Agalmatium* Emeljanov, 1971*****Agalmatium bilobum* (Fieber, 1877)****Synonym:** = *angustum* Melichar, 1906 = *dubium* Melchar, 1906 = *inconspicuum* Matsumura, 1910.**Distribution:** BG, FR, DE, GR, IT, MD, PT, S-RU, SA, ES, UA, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 54, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 31, 35, 29, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 58, 59, 60, 64, 66, 71).

Kırşehir prov.: Centre, Kervansaray, Yozgat prov.: Akdağmadeni, Çamlık, Sivas prov.: İshan, Koyulhisar, Kelkit, (Kartal, 1985b); Adana prov.: Pozantı, Hatay prov.: Yayladağ-Belen (Linnavuori, 1965), Adapazarı, Adıyaman prov.: Besni, Centre, Afyon prov.: Sultandağı, Ankara prov.: Centre, Çubuk, Karagöl, Aydın prov.: Nazilli, Söke, Söke-Samsun dağı, Balıkesir prov.: Balya, Burhaniye, İvrindi, Dursunbey, Susurluk, Bilecik prov.: Bozhöyük, Gölpazarı, Pazaryeri, Burdur prov.: Centre, Gölhisar, Bursa prov.: Centre, Uludağ, Gemlik, İznik, Mustafakemalpaşa, Çanakkale prov.: Çan, Eceabat, Gelibolu, Gökçeada, Çorum prov.: İskilip, Osmançık, Denizli prov.: Acıpayam, Acıpayam-Kızılhisar, Tavas, Eskişehir prov.: Centre, Çifteler, Mahmudiye, Sarıcakaya, Seyitgazi, Gaziantep prov., Gümüşhane prov.: Şebinkarahisar, İzmir prov.: Çeşme, Selçuk, Kırklareli prov.: Lüleburgaz, Vize, Kütahya prov.: Simav, Malatya prov., Manisa prov.: Akhisar, Alaşehir, Muğla prov.: Centre, Bodrum, Dalaman, Fethiye-Seki, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Tekirdağ prov.: Centre, Hayrabolu, Keşan, Malkara, Tokat prov.: Erbaa, Niksar, Zile, Uşak prov.: Eşme (Lodos & Kalkandelen, 1981a); Sapanca gölü as *Hysteropterum bilobum* Fieber, 1877 (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kalecik (Demir, 2007b); Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Alanya (Okurcalar), Akseki (Erenkaya, Murtiçi), Çıglık, Elmalı (Akçay, Gökpinar), Finike (Dağbağ), Gazipaşa (Çalıpınar, Çalıpınar-Kahyalar), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneyeik), Güllükdağı, Kaş (Kemerköy), Korkuteli (Yazır-İmrahor, Söğütücü), Kemer (Centre), Manavgat (Demirciler, Taşağul, Kilimli, Sağırın, Tilkiler, Yukarışıklar) (Demir, 2007a).

Family: FLATIDAE**Subfamily: FLATINAE****Tribe: PHANTIINI****Genus: *Phantia* Fieber, 1866*****Phantia subquadrata* (Herrich-Schaeffer, 1838)****Distribution:** BG, CY, DO, GR, IT, RO, SC, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 47, 48).

Konya prov. (Fahringer, 1922); Ankara prov.: Baraj, Adana prov.: Bürücek, Toros, Gaziantep prov. (Dlabola, 1957); Hatay prov.: Yayladağı-Belen (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Çubuk Barajı I, Eymir gölü, Şereflikoçhisar, Aydın prov.: Germencik, Karacasu, Bilecik prov., Denizli prov., Diyarbakır prov.: Çınar, Edirne prov., Isparta prov.: Centre, Eğridir, İzmir prov.: Selçuk, Manisa prov.: Gördes, Mardin prov.: Centre, Cizre, Ömerli, Muğla prov.: Fethiye, Marmaris (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı (Demir, 2004a); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Ankara prov.: Etimesgut (Elvanköy), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy, Murtiçi), Güllükdağı, İbradı (Akşahap-İbradı), Korkuteli (Kargalık), Kemer (Sarıncardağı) (Demir, 2007a).

Suborder: CICADOMORPHA
Superfamily: CERCOPOIDEA
Family: CERCOPIDAE

Genus: *Cercopis* Fabricius, 1775

Synonym: = *Triecphora* Amyot et Serville, 1843

***Cercopis intermedia* Kirschbaum, 1868**

Distribution: AL, BG, FR, DE?, GR, IT, PT, S-RU, ES, SW?, YU, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (02, 05, 08, 06, 10, 13, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 43, 39, 47, 46, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 71).

Delice river-Sungurlu (Dlabola, 1971b); Adıyaman prov.: Besni, Amasya prov., Artvin prov.: Ardanuç, Ankara prov.: Çubuk, Lalahan, Kırıkkale prov., Bitlis prov.: Reşadiye, Çanakkale prov.: Ayvacık-Sazlı, Diyarbakır prov.: Y. Konak, Elazığ prov., Eskişehir prov.: Biçer, Sivrihisar, Gaziantep prov., Giresun prov.: Görele, Kayadibi, Hakkari prov.: Centre, Çukurca, Şemdinli, Hatay prov.: Antakya, İskenderun, Isparta prov., İzmir prov.: Bozdağ, Kayseri prov.: Talas, Yeşilhisar, Konya prov.: Beyşehir, Kadınhanı, Kütahya prov., Kırklareli prov.: Lüleburgaz, Mardin prov.: Centre, Mazıdağı, Midyat, Ömerli, Maraş prov.: Afşin, Niğde prov.: Ihlara, Rize prov.: Pazar, Samsun prov., Siirt prov.: Aydınlar, Centre, Trabzon prov.: Zigana, Urfa prov.: Siverek, Uşak prov.: Bölme (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Samsun prov.: Kurupelit, Yakakent-Çamgözü (Kartal et al., 1994); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Sey Hamam, Yukarıçanlı, Yasin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara: Kalecik (Akyurt, İdrisdağı), Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b).

***Cercopis septemmaculata* (Melichar, 1903)**

Distribution: IL, JO, LB, SY, TR.

Distribution in Turkey: (01, 35, 37, 47, 56).

Adana prov.: Ceyhan, İzmir prov.: Bozdağ, Kastamonu prov.: İnebolu, Mardin prov.: Ömerli, Siirt prov.: Aydınlar (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Triecphorella* Nast, 1933

***Triecphorella geniculata* (Horvath, 1881)**

Synonym: = *fasciata* Kirschbaum, 1868.

Distribution: CA, E-TR, GR, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 42, 01, 46, 55).

Konya prov., Adana prov., Maraş prov.: Yarbaşı *Triecphora fasciata* Kbm. (Fahringer, 1922); Samsun prov.: Kurupelit, Yakakent-Çamgözü (Kartal et al., 1994); Antalya prov.: Gündoğmuş (Güneycik, Serinyaka) (Demir, 2007a).

Family: APHROPHORIDAE

Genus: *Lepyronia* Amyot et Serville, 1843

Synonym: = *Euclovia* Matsumura, 1903

***Lepyronia coleoptrata* (Linnaeus, 1758)**

Synonym: = *angulata* Fabricius, 1794 = *grossa* Uhler, 1896 = *unifasciata* Fabricius, 1781.

Distribution: AL, AT, BE, BH, BG, CA, CS, DK, EE, TR, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MC, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC.

Distribution in Turkey: (01, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 35, 36, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 60).

Adana prov., Maraş prov.: Yarbaşı (Fahringer, 1922); Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam, Adana prov.: Bürücek, Karataş, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Afyon prov.: Sincanlı, Ankara prov.: Çubuk, Çubuk Barajı I, Eymir gölü, Mogan, Hasanoğlan, Şereflikoçhisar-Tuz gölü, Artvin prov.: Fidanlık, Aydın prov.: Kuşadası, Bilecik prov.: Centre, Bozhöyük, Bursa prov.: Centre, Keleş, Çanakkale prov.: Çan, Gökçeada, Çankırı prov., Çorum prov.: Centre, İskilip, Diyarbakır prov.: Centre, Silvan, Edirne prov.: Centre, Babaeski, İpsala, Erzincan

prov., Gümüşhane prov.: Kop, Şiran, İzmir prov.: Ayrancılar, Bornova, Kars prov.: Sarıkamış, Kütahya prov.: Domaniç, Manisa prov.: Akhisar, Mardin prov.: Cizre, Muğla prov.: Köyceğiz, Marmaris, Muş prov.: Sakarya prov.: Adapazarı-Sapanca, Siirt prov.: Tokat prov.: Zile (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Samsun prov.: Kurupelir, Yakakent-Çamgözü, Ayvacık (Kartal et al., 1994); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Belpınar, Salin, Sey Hamamı, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara: Yenimahalle, Karyagözü, Memlik (Demir, 2004a); Ankara: Kalecik (Akyurt, İdrisdağı), Sincan Mülk, Çaldığı (Demir, 2007b); Antalya prov.: Aksu (Perge), Alanya (Keşefli, Okurcalar, Yeşilköy), Finike, Gazipaşa (Çalınar-Kahyalar, Macarköy), Gündoğmuş (Güneycik), Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası, Sülekler), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Değirmenli, Demirciler, Külcüler, Tilkiler) (Demir, 2007a).

Genus: *Neophilaenus* Haupt, 1935

Neophilaenus campestris (Fallen, 1805)

Synonym: = *parvula* Vismara, 1877.

Distribution: AL, AT, BI, BE, BT, BG, CY, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, Sicily, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 31, 02, 06, 07, 08, 13, 16, 17, 26, 28, 35, 39, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 56, 61, 65).

Adana prov.: Pozantı, Hatay prov.: Yayladağı-Belen (Linnavuori, 1965); Adıyaman prov.: Nemrut, Afyon prov.: Gazlıgöl, Ankara prov.: Çubuk Barajı I, Artvin prov.: Murgul, Seyitler, Bitlis prov., Bursa prov.: Mudanya, Uludağ, Zeytinbağı, Çanakkale prov.: Gökçeada, İntepe, Küçükkuşu, Eskişehir prov.: Seyitgazi, Giresun prov., İzmir prov.: Bergama, Bornova, Çeşme, İhca, Menemen, Torbalı, Sabuncubeli, Kırklareli prov.: Vize, Kütahya prov.: Centre, Tavşanlı, Manisa prov.: Gölmarmara, Gördes, Kula, Muğla prov.: Bodrum, Fethiye-Seki, Centre, Nevşehir prov.: Centre-Bağcılık İst., Samsun prov.: Havza, Sinop prov.: Boyabat, Siirt prov., Trabzon prov.: Akçaabat, Arsin, Centre, Van prov.: Tendürek dağı (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (İdrisdağı), Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Alanya (Keşefli, Okurcalar), Gazipaşa (Çalınar-Kahyalar, Çalınar), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik), Manavgat (Centre-Çeltikçi, Bucakşeyhler, Seleukeia, Belenobası, Demirciler, Yukarışıklar-Tilkiler, Tilkiler, Yaylaalan) (Demir, 2007a).

Neophilaenus minor (Kirschbaum, 1868)

Distribution: AL, AT, BE, BG, CS, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, PL, PT, SL, NL, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 10, 42, 58).

Adana prov.: Kızılviran, Ankara prov.: Beynam (Dlabola, 1957); Sivas prov.: Gürün (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Kazdağı (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Salin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyagözü, Memlik (Demir, 2004a); Ankara: Kalecik (Akyurt), Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal yaylası) (Demir, 2007a).

Genus: *Aphrophora* Germar, 1821

Aphrophora corticea Germar, 1821

Distribution: AL, AT, BE, CS, DK, FR, DE, GR, IT, NO, PL, PT, SL, SN, ES, SE, SW, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (03, 06, 07, 09, 11, 17, 32, 43, 48, 60).

Aydın prov.: Samsun dağı (Dlabola, 1977); Aydın prov.: Samsun dağı, Bilecik prov., Çanakkale prov.: Küçükkuşu, Isparta prov.: Eğridir, Kütahya prov.: Domaniç, Muğla prov.: Fethiye, Tokat prov.: Almus, Afyon prov.: Zafertepe (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Gündoğmuş (Güneycik, Serinyaka), Manavgat (Yaylaalan, Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

Genus: *Mesoptyelus* Matsumura, 1904Synonym: = *Lepyroniella* melichar, 1913***Mesoptyelus impictifrons* (Horvath, 1911)****Distribution:** EG, IL, JO, LB, SY, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 31, 33).Hatay prov.: Yayladağı (Linnavuori, 1965); Antalya prov.: Alanya, Gazipaşa, İçel prov.: Anamur, Aydıncık, Ovacık as *Philaenus impictifrons* Horvath, 1911 (Dlabola, 1971a).**Genus: *Philaenus* Stal, 1864*****Philaenus signatus* Melichar, 1896****Distribution:** AL, CR, CA, CL, CY, DO, GR, N-AE, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 35, 48, 80).

Adana prov.: Gavur Dağı (Dlabola, 1957); İzmir prov., Muğla prov.: Fethiye (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Osmaniye prov.: Nur dağ (Dlabola, 1971a); Antalya prov.: Güllükdağı (Demir, 2007a).

Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758)*Distribution:** AL, AT, AO, BI, BE, BH, BT, BG, CI, Channel Is., CO, CR, CA, CL, CY, CS, DK, Dodecanese Is., EE, TR, FI, FR, DE, Gibraltar, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MC, ML, MD, N-AE, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, AR, AS, EP, NE, NA, NR, N-AC, OR.**Distribution in Turkey:** (01, 14, 41, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 60, 65, 76).İstanbul prov.: Polenezköy, İzmit prov.: Gebze, Eskişehir prov. as *Philaenus leucopthalmus* L. (Fähringer, 1922); Samsun prov.: Kurupelit, Bafra, Ayvacık, Yakakent-Çamgözü (Kartal et al., 1994); Ankara prov.: Beynam, Mollafeneri, Adana prov.: Kayalı Dağ (Dlabola, 1957); Bartın prov.: Akçakoca, İzmit prov. (Linnavuori, 1965); Ağrı prov.: Hamur, Tahir geçidi, Amasya prov., Ankara prov.: Çamkoru, Çubuk, Eymir gölü, Mogan gölü, Hasanoğlan, Karagöl, Artvin prov.: Centre, Fidanlık, Kafkas, Marsivan, Seyitler, Borçka, Murgul, Aydın prov.: Germencik, Balıkesir prov.: Erdek, Gönen, Bilecik prov.: Pazaryeri, Bitlis prov.: Tatvan, Bursa prov.: Çamlık, Çınarcık, İznik, Mudanya, Orhaneli, Uludağ, Çanakkale prov.: Abide, Biga, Gelibolu, Gökçeada, İntepe, Ezine, Elazığ prov.: Gezin, Hazar, Erzincan prov.: Bahçelikköy, Centre, Çağlayan, Dumanlıdağ, Demirpınar, Refahiye, Üzümlü, Erzurum prov.: Tortum, Tufanç köyü, Giresun: Şebinkarahisar, Gümüşhane prov.: Kelkit, Şiran, Centre, Hakkari, İzmir prov.: Balçova, Bornova, Dikili, Kozak, Bozdağ, Tire, Urla, Yamanlar, Kars prov.: Başköy, Gaziler, Kağızman, Iğdır prov., Kırklareli prov.: Pınarhisar, Vize, Kütahya prov., Kocaeli prov.: İzmit, Değirmendere, Malatya prov., Manisa prov.: Gördes, Kırkağaç, Gölarmara, Mardin prov.: Nusaybin, Sultanşehmez, Ömerli, Midyat, Mazıdağ, Muğla prov.: Bodrum, Köyceğiz, Ordu prov.: Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ünye, Rize prov.: Centre, Fener, Hayrat, Samsun prov.: Centre, Bafra, Çarşamba, Dereköy, Siirt: prov. Baykan, Sinop prov.: Centre, Gerze, Mertoğlu, Tekirdağ prov.: Şarköy, Saray, Centre, Trabzon prov.: Akçaabat, Derecik, Centre, Sürmene, Kop, Zigana, Maçka, Tokat prov.: Centre, Artova, Van: Çaldıran, Gürpınar, Edremit, Gevaş, Başkale, Elmalı, Çatak, Erciş, Tendirek dağı, Akköprü, Beyüzümü, Başkale-Güzelsu (Lodos & Kalkandelen, 1981c); Sapanca gölü, Karahan Pass, Nurhak Mountain, Sivas prov.: Gürün, Malatya prov.: Balaban, Van prov.: Gevaş, Van gölü, Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Sey Hamamı, Yenimahalle, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyagıdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt, İdrisdağı) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Alanya (Keşefli, Okurcalar), Gazipaşa (Çalınar, Çalınar-Kahyalar), Gündoğmuş (Güneycik, Çiçekoluk, Serinyaka), Manavgat (Demirciler, Külçüler, Centre-Çeltikçi, Beşkonak, Belenobası, Bucakşeyhler, Seleukeia, Evrenleriyavşı, Söylerkale, Hocalı, Saraçlı, Yaylaalan, Tilkiler, Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2007a).

Superfamily: CICADOIDEA**Family: CICADIDAE****Subfamily: CICADINAE****Tribe: CICADINI****Genus: *Cicadatra* Kolenati, 1857**

Synonym: = *Psalmocharias* Kirkady, 1908 = *Rustavelia* Horvath, 1912

***Cicadatra adanai* Kartal, 1980**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 07).

Adana prov.: Centre (Kartal, 1980); Antalya prov.: Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik), Güllükdagi, İbradı (Üzümdere), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Demirciler) (Demir, 2007a).

***Cicadatra atra* (Olivier, 1790)**

Synonym: = *appendiculata* Linnavuori, 1954 = *transversa* Germar, 1830.

Distribution: AL, BG, CO, CY, DO, TR, FR, GR, IT, RO, SC, ES, SW, UA, YU, NE.

Distribution in Turkey: (01, 05, 06, 07, 11, 22, 24, 27, 34, 35, 46, 48, 56, 58, 63).

Adana prov.: Amanos Mountain, Maraş prov.: Göksun (Fahringer, 1922); Adana prov., Amasya prov., Ankara prov.: Centre, Elmadağ, Antalya prov., Bitlis prov., Edirne prov., Erzincan prov., Gaziantep prov., İstanbul prov.: Erenköy, İzmir prov.: Bornova, Gaziemir, Karaburun, Torbalı-Ayrancılar, Muğla prov.: Bodrum, Köyceğiz, Siirt prov.: Sason, Sivas prov.: Suşehri, Urfa prov.: Centre, Akziyaret (Lodos & Kalkandelen, 1981b).

***Cicadatra hyalina* (Fabricius, 1798)**

Synonym: = *burriana* Horvath, 1912 = *geodesma* Kolenati, 1857 = *taurica* Fieber, 1876 = *virens* Fieber, 1876 = *viridis* Haupt, 1917.

Distribution: GR, MD, S-RU, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (02, 06, 07, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 46, 50, 51, 56, 63, 65).

Hatay prov.: Akbez, Hassa, Kırıkhan, Gaziantep prov.: İslahiye, Centre, Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1987); Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Besni, Kahta, Karıcık, Ankara prov.: Çubuk, Baraj I, Elazığ prov., Erzincan prov., Gümüşhane, Hakkari prov.: Üzümcü, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Bornova, Kemalpaşa, Torbalı, Siirt prov.: Aydınlar, Kozluk, Sason, Şirvan, Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Erciş, Gevaş (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Ankara prov.: Bağlum, Çubuk, Elmadağ, Keçiören, Nevşehir prov.: Centre, Niğde prov.: Ulukışla, Bor, Konya prov.: Ayrancı, Ereğli, Maraş prov.: Centre (Kartal & Zeybekoğlu, 1999); Ankara prov.: Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

***Cicadatra persica* Kirkaldy, 1909**

Synonym: = *lineola* Hagen, 1856.

Distribution: MO, SC?, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 13, 15, 29, 44, 46).

Adana prov., Maraş prov.: Yarbaşı as *Cicadatra lineola* Hag. (Fahringer, 1922); Ankara prov.: Centre, Çubuk Barajı I, Bitlis prov.: Centre, Çukur, Burdur prov., Gümüşhane prov. (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Malatya prov.: Darende (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Sincan Mülk (Demir, 2007b).

Genus: *Cicada* Linnaeus, 1758

Synonym: = *Macroprotopus* Costa, 1877 = *Tettigia* Kolenati, 1857 = *Tibicen* Latreille, 1825

***Cicada lodosi* Boulard, 1979**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07, 35, 45).

Manisa prov.: Gördes (Boulard, 1979); İzmir prov.: Çiçekli, Manisa prov.: Gördes (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Antalya prov.: Çiğlık, Düzlerçamı (Demir, 2007a).

Cicada mordoganensis* Boulard, 1979*Distribution:** N-AE, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 35, 48).

İzmir prov.: Mordoğan (Boulard, 1979); Antalya prov.: Alanya, Side, Ulupınar, Yenice, İzmir prov.: Balıkkıova, Gazıemir, Karaburun, Mordoğan, Torbalı, Urla, Muğla prov.: Bodrum (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Antalya prov.: Alanya (Keşefli), Manavgat (Demirciler, Değirmenli) (Demir, 2007a).

Cicada orni* Linnaeus, 1758*Synonym:** = *oleae* Costa, 1877 = *punctata* Fabricius, 1798.**Distribution:** AL, AT, BI, BG, CO, CR, CA, CL, CY, CS, DO, FR, HU, IT, N-AE, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SW, UA, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 08, 09, 10, 21, 35, 46).Maraş prov.: Yarbaşı as *Tettigia orni* L. (Fahringer, 1922); Gülek (Linnavuori, 1965); Artvin prov.: Centre, Oruçlu, Zeytinli, Aydın prov.: Centre, Söke-Samsun dağı, Balıkesir prov.: Erdek, Diyarbakır prov.: Lice, İzmir prov.: Bornova, Menemen (Lodos & Kalkandelen, 1981b).***Cicada permagna* (Haupt, 1917)****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07, 33).

Antalya prov.: Alanya (Boulard, 1979); İçel prov.: Silifke (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Güllükdagi, Gündoğmuş (Çiçekoluk), Kemer (Olympos National Park), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2007a).

Subfamily: PLATYPLEURINAE**Tribe:** CRYPTOTYMPANINI**Genus:** *Lyristes* Horvath, 1926***Lyristes plebejus* (Scopoli, 1763)****Synonym:** = *ACna* Metcalf, 1955 = *fraxini* Fabricius, 1803 = *obscura* Fabricius, 1803.**Distribution:** AL, AT, BG, CY, CS, TR, FR, DE, GR, HU, IT, PL, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SW, UA, YU, NE.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 20, 24, 27, 35, 34, 39, 45, 46, 47, 48, 43).İzmir prov., Bursa prov.: Mudanya Maraş prov.: Yarbaşı as *Cicada plebeja* Scop. (Fahringer, 1922); Ankara prov.: Baraj, Adana prov.: Bürücek (Dlabola, 1957); Gülek (Linnavuori, 1965); Adana prov., Ankara prov.: Centre, Çubuk Barajı I, Antalya prov., Artvin prov., Aydın prov.: Nazilli, Söke-Samsun dağı, Balıkesir prov.: Edremit, Denizli prov.: Acipayam, Erzincan prov., Gaziantep prov.: Nizip, İzmir prov.: Bayındır, Menemen, İstanbul prov., Kırklareli prov.: Türkgeldi-Lüleburgaz, Manisa prov.: Akhisar, Mardin prov., Muğla prov.: Köyceğiz, Kütahta prov.: Gediz (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Manisa prov.: 5 km SW Manisa as *Tibicen plebejus* Scopoli, 1763 (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya, Güneykaya), Alanya, Güllükdagi, Gündoğmuş (Güneycik), Kemer (Sarçınardağı), Korkuteli (Söğütçük), Kaş (Beldibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler, Değirmenli) (Demir, 2007a).**Family:** TIBICINIDAE**Subfamily:** TIBICININAE**Tribe:** Tibicinini**Genus:** *Tibicina* Kolenati, 1857**Synonym:** = *Euryphara* Horvath, 1912***Tibicina haematodes* (Scopoli, 1763)****Synonym:** = *cantans* Fabricius, 1794 = *helveola* Germar, 1821 = *sanguinea* Fabricius, 1803. **Distribution:** AL, AT, BG, CO, CA, CS, FR, HU, IT, MC, MD, PT, RO, S-RU, SC, SL, SN, ES, SW, UA, YU, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (07, 34, 46).

İstanbul prov. Belgrat forest, Polenezköy, Maraş prov.: Amanos Mountain (Fahringer, 1922); Antalya prov.: Kaş (Beldibi) (Demir, 2007a).

Tribe: CICADETTINI

Genus: *Pagiphora* Horvath, 1912***Pagiphora annulata* (Brulle, 1832)**

Distribution: AL, BG, CS, GR, MC, SL, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (31, 35, 59).

Hatay prov.: Yayladağı (Linnavuori, 1965); İzmir prov.: Gümüldür, Tekirdağ prov.: Centre, Hayrabolu, Gelibolu (Lodos & Kalkandelen, 1981b).

***Pagiphora aschei* Kartal, 1978**

Distribution: CR, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Kemer (Kartal, 1983); Antalya prov.: Akseki (Güneykaya), Güllükdığı, Manavgat (Demirciler) (Demir, 2007a).

***Pagiphora yanni* Boulard, 1993**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Sarıçam (Boulard, 1993).

Genus: *Tettigetia* Kolenati, 1857***Tettigetia dimissa* (Hagen, 1856)**

Distribution: AL, CR, GR, IT, SC, SN, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 09, 29, 31, 32, 34, 35).

İstanbul prov.: Polenezköy, Amanos Mountain *Melampsalta dimissa* Hag. (Fahringer, 1922); Antalya prov., Aydın prov.: Kuşadası, Söke-Samsun dağı, Gümüşhane prov., Isparta prov., İzmir prov.: Bornova, Menemen-Hatundere (Lodos & Kalkandelen, 1981b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler) as *Cicadetta dimissa* Hagen, 1856 (Demir, 2007a).

Genus: *Cicadetta* Kolenati, 1857***Cicadetta montana* Scopoli, 1772**

Distribution: AT, BE, BG, BO, MV, SL, DK, FI, FR, CO, DE, GB, GR, HU, IT, SC, NO, IL, PL, ES, SE, SW, TR, AZ, GG, KG, MD, N-RU, M-RU, S-RU, TJ, UA, YU.

Distribution in Turkey: (01, 34).

İstanbul prov.: Belgrat forest *Melampsalta montana* Scop. (Fahringer, 1922); Adana prov.: Bűrücke (Dlabola, 1957).

***Cicadetta sibilatrix* Horvath, 1901**

Distribution: IL, SY, TR.

Distribution in Turkey: (35, 46, 33).

İzmir prov., İçel prov., Maraş prov.: Amanos Mountain *Melampsalta sibilatrix* Horv. (Fahringer, 1922).

Superfamily: MEMBRACOIDEA**Family: MEMBRACIDAE****Subfamily: CENTROTINAE****Genus: *Gargara* Amyot et Serville, 1843*****Gargara genistae* (Fabricius, 1775)**

Synonym: = *okinawanus* Matsumura, 1936.

Distribution: AL, AT, BE, BH, BT, BG, CA, CS, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MC, MD, PL, PT, RO, M-RU, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, AR, EP, NE, NA, N-AC, OR, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 09, 10, 19, 25, 35, 48).

Ankara prov.: Mogan Gölü (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Mogan gölü, Eymir gölü, Lalahan, Aydın prov.: Kuşadası, Balıkesir prov.: Dursunbey, Çorum prov.: Bayat, Erzurum prov.: Centre, Hasankale, Horasan, İspir-Serçeme deresi, İzmir prov.: Bozdağ, Pamucak, Muğla prov.: Bodrum, Köyceğiz (Lodos & Kalkandelen, 1981c), Balıkesir prov.: Kazdağı (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Salin) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Çıglık, Güllükdağı (Demir, 2007a).

Genus: *Centrotus* Fabricius, 1803

***Centrotus cornutus* (Linnaeus, 1758)**

Distribution: AL, AT, Belarus, BE, BH, BT, BG, CA, CS, DK, EE, TR, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MC, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, S-RU, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE.

Distribution in Turkey: (06, 07, 54, 08, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 22, 28, 34, 35, 41, 43, 39, 52, 54, 59).

Bilecik prov., İstanbul prov.: Belgrat forest, Kuşcular (Fahringer, 1922); Adapazarı: Hendek, Artvin prov.: Hopa, Aydın prov.: Karacasu, Bilecik prov.: Bozhöyük, Bursa prov.: İznik, Mudanya, Uludağ, Çorum prov., Denizli prov., Erzincan prov.: Başköy, Edirne prov.: Keşan, Giresun prov.: Görele, İzmir prov.: Kozak, Kocaeli prov.: İzmit, Kütahya prov.: Domaniç, Kırklareli prov.: İğneada, Kiyıköy, Pınarhisar, Ordu prov.: Ünye-Yılanlıkaya, Tekirdağ prov.: Saray (Lodos & Kalkandelen, 1981c), Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Güllükdağı (Demir, 2007a).

Family: ULOPIDAE

Genus: *Utecha* Emeljanov, 1996

***Utecha trivialis* (Germar, 1821)**

Synonym: = *decussata* Germar, 1821 = *germari* Fieber, 1872 = *grisea* Walker, 1851.

Distribution: AL, AT, BE, BT, BG, CY, CS, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MD, PL, PT, RO, S-RU, SL, SN, ES, SW, UA, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (04, 06, 07, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 35, 37, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 63).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Çamlıdere, Işıkdığı, Edirne prov. *Ulopa trivialis* Germar, 1821 (Dlabola, 1957); Ağrı prov.: Hamur, Ankara prov.: Çubuk, Çubuk Barajı I, Eymir gölü, Karagöl, Lalahan, Bilecik prov.: Söğüt, Çanakkale prov.: Gökçeada, Çorum prov., Denizli prov.: Çardak-Çanbaşı, Elazığ prov.: Harput, Gümüüşhane prov.: Kelkit, Kop, İzmir prov.: Bozdağ, Kastamonu prov., Manisa prov.: Gölarmara, Mardin prov.: İdil, Sultanşehmuz, Yukarıkonak, Muğla prov.: Fethiye-Seki, Rize prov.: Kaçkar dağı, Siirt prov., Sivas prov.: Suşehri, Urfa prov.: Siverek (Lodos & Kalkandelen, 1981d); Nevşehir prov.: Ürgüp, Malatya prov.: Balaban as *Ulopa trivialis* Germar, 1821 (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Aköz, Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Gazipaşa (Çalıpınar), Güllükdağı (Demir, 2006c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2007b).

Family: CICADELLIDAE

Subfamily: MEGOPHTHALMINAE

Genus: *Megophthalmus* Curtis, 1833

***Megophthalmus scabripennis* Edwards, 1915**

Distribution: AL, AT, BE, BT, BG, CO, FR, DE, GR, IT, S-RU, SA, SC, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 16, 33, 35, 45, 48).

Adana prov.: Balcalı, İçel prov.: Erdemli, Alata (Başpınar & Uygun, 1991a); Ankara prov.: Çamlıdere, Işıkdığı (Dlabola, 1957); Bursa prov.: İznik, İzmir prov.: Balçova, Ödemiş-Bozdağ, Manisa prov.: Gölarmara, Sultanyayla, Muğla prov.: Bodrum (Lodos & Kalkandelen, 1981d). Antalya prov.: Akseki (Geriş), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

Subfamily: MACROPSINAE**Genus: *Oncopsis* Burmeister, 1838*****Oncopsis tristis* (Zetterstedt, 1840)****Synonym:** = *brevicauda* Thomson, 1870 = *frontalis* Flor, 1861 = *rufusculus* Fieber, 1868.**Distribution:** AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, NO, PL, RO, N-RU, SC, SL, SN, SE, SW, NL, UA, Vatican City, NE, OR, TR.**Distribution in Turkey:** (33).

İçel prov.: Silifke (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Macropsis* Lewis, 1834***Macropsis albae* Wagner, 1950****Distribution:** AT, BE, BT, BG, CS, EE, FR, DE, IT, LA, LI, MD, PL, PT, SW, NL, UA, YU, EP, NA, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Elmalı (Çobanisa, Akçay, Gümüşyaka), Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası), Güllükdağı (Demir, 2006c).

Macropsis graminea* (Fabricius, 1798)*Synonym:** = *populi* Edwards, 1919.**Distribution:** AT, BT, BG, CS, FR, DE, HU, IT, MD, NO, PT, SA, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (02, 04, 06, 07, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 39, 42, 43, 45, 60, 61, 62, 65).

Ankara prov.: Baraj, Beynam, Ayaş (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Kahta, Ağrı: Taşlıçay, Ankara: Çubuk, Çubuk Barajı II., Karagöl, Eymir gölü, Kayaş, Lalahan, Beypazarı, Bitlis prov.: Tatvan, Çanakkale prov.: Eceabat, Diyarbakır prov.: Lice, Ziyaret köyü, Edirne prov.: Havsa, Lalapaşa, Elazığ prov.: Hazar gölü, Karakoçan, Eskişehir prov.: Mahmudiye, Gümüşhane prov.: Şiran, Kırklareli prov.: Pınarhisar, Konya prov.: Akşehir, Kütahya prov.: Domaniç, Manisa prov.: Alaşehir, Sultanyayla, Tokat prov.: Centre, Artova, Trabzon prov., Tunceli prov., Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1981d); Karahan Pass, Nurhak Mountain (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Salin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Elmalı (Akçay) (Demir, 2006c).

Genus: *Hephathus* Ribaut, 1952***Hephathus freyi* (Fieber, 1868)****Distribution:** DZ, BG, SL, FR, IT, SC, MA, ES, BI, TR, YU.**Distribution in Turkey:** (01, 33).

Adana prov.: Kozan, Gavur Dağı, İçel prov.: Alata (Dlabola, 1957).

Hephathus unicolor* (Lindberg, 1926)*Synonym:** = *canus* Dlabola, 1961.**Distribution:** RO?, S-RU?, UA?, YU?, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov. (Linnavuori, 1965).

Subfamily: AGALLIINAE**Tribe: AGALLIINI****Genus: *Anaceratagallia* Zachvatkin, 1946*****Anaceratagallia laevis* (Ribaut, 1935)****Distribution:** AL, BT, BG, CI, Channel Is., CY, FR, GR, HU, IT, MD, PT, RO, S-RU, SA, SC, ES, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 04, 06, 07, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 63, 66, 67).

Adana prov.: Kozan, Karataş, Kızılviran, Ağapınarı, Misis, Gavur Dağı, Ankara prov.: Beynam, Baraj, Mogan Gölü (Dlabola, 1957); Eskişehir-Bilecik (Dlabola, 1971b); Ağrı prov.: Tutak, Ankara prov., Bilecik prov.: Gölpazarı, Bitlis prov.: Reşadiye, Çanakkale prov.: Gökçeada, Diyarbakır prov.: Centre, Silvan, Elazığ prov.: Karakoçan, Hatay prov.: İskenderun, İstanbul, İzmir prov.: Narlıdere, İnciraltı, Dikili, Çandarlı, Çiçekli, Bayındır, Kırklareli prov., Malatya prov., Manisa prov.: Alaşehir, Mardin prov.: Ömerli, Muğla prov.: Gökova, Fethiye, Nevşehir prov.: Ürgüp, Niğde prov.: Centre, Bor, Ordu prov.: Mesudiye, Samsun prov.: Bafra, Siirt prov.: Kozluk, Centre, Urfa prov.: Centre, Ceylanpınar, Taşlı-Siverek, Yozgat prov.: Yerköy, Zonguldak prov.: Ereğli (Lodos & Kalkandelen, 1981d); Nevşehir prov.: Ürgüp, Malatya prov.: Darende, Erzurum prov. (Dlabola, 1981); Adana prov.: Balcalı, Hacıali, Kadirli, Şihmurat, İçel prov.: Erdemli, Alata (Başpınar & Uygun, 1991a); Antalya prov.: Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik, Serinyaka), Manavgat (Bucakşeyhler, Belenobası, Beşkonak, Manavgat-Çeltikçi, Çayyazı, Demirciler, Karaöz, Taşağıl, Kilimli), Elmalı, Alanya (Kargıcak, Keşefli, Obaköy, Okurcalar), Gazipaşa (Çalıpınar, Macarköy), Kemer (Çamyuva, Ovacık), Finike (Turunçova, Yeşilyurt), Güllükdagi, Kale (Köşkerler), Kumluca (Kavakköy), Serik (Aspendos) (Demir, 2006c); Ankara: Kalecik (Gölköy), Sincan Mülk (Demir, 2007b).

***Anaceratagallia ribauti* (Ossiannilsson, 1938)**

Distribution: AL, AT, BE, BG, BO, MV, SL, FI, FR, DE, GB, GR, IT, NL, PL, PT, RO, SE, SW, TR, Altai Mts., AM, EE, MD, M-RU, S-RU, UA, YU.

Distribution in Turkey: (41, 06, 07, 11, 32, 35, 50, 59, 61).

Adana prov.: Balcalı, Hacıali, Kadirli, Şihmurat, Hatay prov.: Arsus, Dörtöyl, İçel prov.: Doğankent, Erdemli, Alata, Tarsus, Tecirli (Başpınar & Uygun, 1991a); Adapazarı, Ankara prov.: Elmadağ, Karagöl, Antalya prov.: Korkuteli, Bilecik prov.: Gölpazarı, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Kemalpaşa, Nevşehir prov., Tekirdağ prov., Trabzon prov. (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Nur dağ, 15 km N Mezikli (Dlabola, 1971).

Genus: *Austroagallia* Evans, 1935

Synonym: = *Peragallia* Ribaut, 1948

***Austroagallia sinuata* (Mulsant et Rey, 1855)**

Synonym: = *feberi* Vismara, 1878 = *homeyeri* Kirschbaum, 1868 = *quadrisignata* Flor, 1861. **Distribution:** AT, BI, BE, BT, BG, CI, CR, CY, GR, HU, MD, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, ES, SW, YU, AR, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 21, 24, 30, 33, 35, 76, 40, 46, 47, 48, 50, 55, 73).

Adana prov.: Balcalı, İçel prov.: Erdemli, Alata (Başpınar & Uygun, 1991a); Adana prov.: Centre, Karataş, Kozan, Ankara prov.: Baraj *Peragallia sinuata* Mulsant Rey, 1855 (Dlabola, 1957); Fevzipaşa-Mersin, Baykan-Silvan (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Elmadağ, Diyarbakır prov.: Centre, Devegeçidi, Silvan, Erzincan prov.: Örek, Hakkari prov.: Beytülshebap, İzmir prov.: Bozdağ, Çeşme, Iğdır prov., Kırşehir prov.: Yıladağı, Mardin prov.: Nusaybin, Muğla prov.: Fethiye, Nevşehir prov.: Nar, Samsun prov., Siirt prov.: Şırnak (Lodos & Kalkandelen, 1981d); Gülşehir; Kızılırmak Ufer, Nevşehir prov.: Ürgüp (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Alanya (Obaköy), Gündoğmuş (Serinyaka), Manavgat (Bucakşeyhler, Hacıobası, Karaöz), Kemer (Bögürtlenözü), Korkuteli (Kargalık) (Demir, 2006c).

Genus: *Dryodurgades* Zachvatkin, 1946

***Dryodurgades anaticus* Dlabola, 1957**

Distribution: BG, GR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07).

Adana prov.: Bürücek (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdagi, Salin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2007b), Antalya prov.: Elmalı (Çiğlikara), Güllükdagi, Gündoğmuş (Güneycik) (Demir, 2006c).

***Dryodurgades dlabolai* Wagner, 1963**

Distribution: BG, FR, GR, HU, IT, MD, S-RU, SW, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (06, 33, 35, 66).

Ankara prov.: Kızılcahamam (Kartal, 1981); İçel prov.: Silifke, İzmir prov.: Ödemiş, Yozgat prov.: Çekerek, Sarıkaya (Lodos & Kalkandelen, 1988).

***Dryodurgades reticulatus* (Herrich-Schaeffer, 1834)**

Distribution: AL, AT, BE?, BG; CS, FR, DE, GR, IT, MD?, PT?, RO, S-RU, SC, ES, SW, YU, EP?, NE?, TR.

Distribution in Turkey: (03, 06, 15, 18, 21, 32, 38, 42, 43, 51, 52, 57, 64, 66).

Niğde prov.: Demirkazık, Konya prov.: Ereğli (Kartal, 1981); Afyon prov.: Dinar, Ankara prov.: Çubuk, Karagöl, Eymir gölü, Burdur prov.: Çankırı prov.: Ilgaz dağı, Diyarbakır prov.: Silvan, Isparta prov.: Eğridir, Kayseri prov.: Pınarbaşı, Konya prov.: Beyşehir, Kütahya prov.: Altıntaş, Simav, Ordu prov.: Mesudiye, Sinop prov.: Boyabat, Uşak prov.: Banaz, Yozgat prov.: Çekerek (Lodos & Kalkandelen, 1981d).

Subfamily: IDIOCERINAE**Genus: *Rhytidodus* Fieber, 1868*****Rhytidodus boluicus* Dlabola, 1970**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 18, 21, 35, 38, 45).

Adana prov.: Hasanbeyli, Ankara prov.: Bağlum, Beypazarı, Çankırı prov.: Şabanözü, Diyarbakır prov.: Centre, İzmir prov.: Ayrancılar, Kayseri prov.: Hacılar, Manisa prov.: Alaşehir (Lodos & Kalkandelen, 1982a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Seyhamamı) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler, Boztepe), Elmalı (Gümüştayaka), Finike (Turunçova), Serik (Aspendos, Köprüçayı) (Demir, 2006c).

***Rhytidodus wagneri* Dlabola, 1965**

Distribution: AT?, IT, SL, UA, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 42, 45, 50, 51).

Adana prov.: Hasanbeyli, Ankara prov.: İçeri Çumra, Manisa prov.: Alaşehir, Gördes, Nevşehir prov.: Çat, Niğde prov.: Ulukışla, Çiftehan, Ihlara (Lodos & Kalkandelen, 1982a).

Genus: *Idiocerus* Lewis, 1834***Idiocerus vicinus* Melichar, 1898**

Distribution: AT, FR, DE, GR, IT, S-RU, SN, ES, SW, NL, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 11, 22, 26, 38, 43, 45, 51).

Adana prov.: Hasanbeyli, Ankara prov.: Centre, Bağlum, Bilecik prov., Edirne prov.: Lalapaşa, Eskişehir prov.: Seyitgazi, Kayseri prov.: Yeşilhisar, Kütahya prov., Manisa prov.: Alaşehir, Niğde prov.: Ihlara (Lodos & Kalkandelen, 1982a).

Genus: *Sulamicerus* Dlabola, 1974***Sulamicerus ancorarius* (Dlabola, 1964)**

Distribution: AF, TR.

Distribution in Turkey: (07, 21, 42, 56).

Diyarbakır prov.: Lice, Konya prov.: Ermenek, Siirt prov.: Şirvan (Lodos & Kalkandelen, 1982a); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

***Sulamicerus stali* (Fieber, 1868)**

Synonym: = *bicolor* Melichar, 1896 = *toktogulensis* Dubovsky, 1970.

Distribution: BG, CY, DO, GR, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 02, 35, 45, 48, 27, 63, 46, 56, 44).

Adana prov.: Abacılar (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Besni, Gaziantep prov.: Centre, Çağdın, Güneriz, Araban, Manisa prov.: Alaşehir, K. Belen, Muğla prov.: Bodrum, Gökova, Güllük, Marmaris, Urfa prov.: Birecik, Centre (Lodos & Kalkandelen, 1982a).

Genus: *Bugraia* Koçak, 1981Synonym: = *Taeniocerus* Dlabola, 1974***Bugraia ocularis* (Mulsat & Rey, 1855)****Synonym:** = *taenitops* Fieber, 1868.**Distribution:** AL, BI, CO, CY, FR, GR, IT, PT, SA, SC, ES, NL?, UA, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (33).İçel prov.: Erdemli as *Taeniocerus ocularis* Mulsant Rey, 1855 (Dlabola, 1981).**Genus: *Viridicerus* Dlabola, 1974*****Viridicerus ustulatus* (Mulsant et Rey, 1855)****Synonym:** = *prasinus* Kirschbaum, 1868 = *salicetorum* Mulsant et Rey, 1855 = *viridis* Schrank, 1801.**Distribution:** AT, BE, BG, CS, FR, DE, GR, HU, IT, MD, PL, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, ES, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (11, 15, 42).

Bilecik prov.: Bozhöyük, Burdur prov.: Centre, Konya prov.: Akşehir, Çumra (Lodos & Kalkandelen, 1982a).

Genus: *Tremulicerus* Dlabola, 1974***Tremulicerus fulgidus* (Fabricius 1775)****Synonym:** = *aurulentus* Kirschbaum, 1868 = *cupreus* Kirschbaum, 1868 = *decipiens* Kirschbaum, 1868 = *fuchsii* Kirschbaum, 1868 = *kirschbaumi* Baker, 1924 = *lineolata* Ribaut, 1952 = *mesopyrrhus* Kirschbaum, 1868 = *socialis* Fieber, 1868 = *variegata* Ribaut, 1952. **Distribution:** AT, BE, BT, BG, CO, CS, DK, FR, DE, GR, HU, IT, PL, PT, RO, SL, ES, SW, NL, UA, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 13, 18, 29, 35, 42, 45, 65).Adana prov.: Pozantı, Ankara prov.: Eymir gölü, Bitlis prov.: Tatvan, Çankırı prov.: Gümüşhane prov.: Kelkit, İzmir prov.: Ödemiş-Bozdağ, Konya prov.: Meram, Seydişehir, Manisa prov.: Alaşehir, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1982a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıklıdağı, Aköz) as *Tremulicerus mesopyrrhus* Kirschbaum, 1868 (Demir, 2006b); Antalya: Manavgat (Bucakşeyhler, Hacıobası), Elmalı (Çobanisa), Serik (Aspendos) as *Tremulicerus mesopyrrhus* Kirschbaum, 1868 (Demir, 2006c).**Genus: *Balcanocerus* Dlabola, 1974*****Balcanocerus balcanicus* (Horvath, 1903)****Distribution:** BG, RO, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 12, 70, 50).Adana prov.: Hasanbeyli, Bingöl prov.: Konya prov.: Karaman prov., Nevşehir prov.: Centre-Bağcılık İst. (Lodos & Kalkandelen, 1982a); Mezikli as *Chunrocerus balcanicus* (Horvath, 1903) (Dlabola, 1971a).**Genus: *Hespericerus* Gnezdilov, 1999*****Hespericerus brusinae* (Horvath, 1891)****Distribution:** CY, IT, S-RU, UA, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 21, 27, 29, 48).

Adana prov., Diyarbakır prov.: Çermik-Sinek, Gaziantep prov.: Araban, Gümüşhane prov.: Torul, Muğla prov.: Centre, Ula (Lodos & Kalkandelen, 1982a).

Subfamily: IASSINAE**Genus: *Batracomorphus* Lewis, 1834**

Batracomorphus glaber* Haupt, 1927*Synonym:** = *flavovirens* Lindberg, 1948.**Distribution:** CY, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 33).

Adana: Balcalı, Şihmurat, İçel: Alata (Başpınar & Uygun, 1991a).

Batracomorphus irroratus* Lewis, 1834*Synonym:** = *microcephalus* Herrich-Schäffer, 1838 = *punctulatus* Forel, 1858 = *punctuosus* Kirschbaum, 1868 = *verrucosa* Haupt, 1917.**Distribution:** AL, AT, BE, BT, BG, CS, DK, FR, DE, GR, HU, IT, LI, MD, PL, S-RU, SL, SW, UA, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 06, 15, 21, 38, 50, 59, 65).

Adana prov.: Gavur Dağı, Ankara prov.: Baraj, Beynam, Mogan Gölü (Dlabola, 1957); Adıyaman prov., Ankara prov.: Çubuk Barajı, Lalahan, Burdur prov., Diyarbakır prov., Kayseri prov.: Erciyes, Yılanlıdağ, Nevşehir prov.: Centre-Bağcılık İst., Gülşehir, Tekirdağ prov.: Şarköy, Van prov.: Kırkgeçit-Gürpınar (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Nevşehir prov.: Ürgüp, Sivas prov.: Gürün, Kandilli(E-Anatolia) (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Işıkdığı, Yasin) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt, Gököl), Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b).

Batracomorphus signatus* Lindberg, 1923*Distribution:** EG, IL, LY, ER, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 76, 47).

Adana prov., Elazığ prov.: Palu, Iğdır prov., Mardin prov.: Midyat (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Antalya prov.: Alanya (Okurcalar) (Demir, 2006c).

Genus: *Iassus* Fabricius, 1803**Synonym:** = *Bythoscopus* Germar, 1833***Iassus pseudocerris* Abdul-Nour, 1998****Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Gündoğmuş (Serinyaka) (Demir, 2006c).

Subfamily: PENTHIMIINAE**Genus: *Penthimia* Germar, 1821*****Penthimia nigra* (Goeze, 1778)****Distribution:** AL, AT, BE, BG, CS, FR, DE, GR, HU, IT, LA?, MD, PL, PT, RO, S-RU, SL, ES, SW, NL, UA, YU, EP?, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 11, 32, 35, 41, 50, 59, 61).

Adapazarı prov., Ankara prov.: Elmadağ, Karagöl, Antalya prov.: Korkuteli, Bilecik prov.: Gölpaazarı, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Kemalpaşa, Nevşehir prov., Tekirdağ prov., Trabzon prov. (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Nur dağ, 15 km N Mezikli (Dlabola, 1971a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b).

Subfamily: DORYCEPHALINAE**Genus: *Paradorydium* Kirkaldy, 1901****Synonym:** = *Bumizana* Distant, 1918***Paradorydium mustafai* Demir, 2005****Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Manavgat (Hacıobası, Örenşehir) (Demir, 2005).

Paradorydium occidentale* Lindberg, 1954*Distribution:** CI, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Gazipaşa (Çalpınar), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2005).

Paradorydium paradoxum* (Herrich-Schaeffer, 1837)*Distribution:** BG, CS, FR, DE?, GR?, PT, ES, NL?, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 21).Ankara prov.: Baraj *Paradorydium lanceolatum* Burmeister, 1838 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı II, Lalahan, Diyarbakır prov. (Lodos & Kalkandelen, 1982b), Ankara prov.: Yenimahalle, Karyagıdıdağı (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan (Mülk. Ayaş Mts.), Antalya prov.: Düzlerçamı (Demir, 2005); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt) (Demir, 2007b).**Genus: *Eupelix* Germar, 1821*****Eupelix cuspidata* (Fabricius, 1779)****Distribution:** AL, AT, BI, BE, BT, BG, CI AL, DZ, AT, BE, BG, CI, CY, BO, MV, SL, DK, EG, FI, FR, DE, GB, HU, IQ, IE, IL, IT, SA, SC, MN, NL, NO, PL, PT, RO, ES, BI, SE, SW, SY, TN, AM, AZ, EE, GG, KG, KK, LA, MD, N-RU, M-RU, S-RU, TJ, UA, UZ, YU.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 03, 06, 07, 08, 17, 21, 42, 44, 47, 51, 63).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Kahta, Nemrut, Afyon prov.: Sincanlı, Ankara prov.: Çubuk, Eymir gölü, Centre, Artvin prov., Çanakkale prov.: Gökçeada, Diyarbakır prov.: Devegeçidi, Konya prov.: Çarıklar, Malatya prov., Mardin prov.: Cizre, Nusaybin, Yukarıkonak, Centre, Niğde prov.: Çiftehane, Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Ankara prov.: Mogan gölü, Nevşehir prov.: Ürgüp, Malatya prov.: Balaban, Karahan Pass, Nurhak Mountain, Kandilli (Dlabola, 1981); Adana prov.: Balcalı, İçel prov.: Erdemli, Alata (Başpınar & Uygun, 1991a); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Sey Hamamı, Yenimahalle, Karagöl, Yasin, Yukarıçanlı) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy), Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Geriş), Alanya (Okurcalar), Gazipaşa (Çalpınar), Güllükdağı, Gündoğmuş (Çiçekoluk), Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası), Manavgat (Demirciler, Tilkiler, Seleukeia, Yaylaalan) (Demir, 2006c); Ankara: Kalecik (İdrisdağı) (Demir, 2007b).

Subfamily: HECALINAE**Genus: *Hecalus* Stal, 1864**Synonym: = *Parabolocratus* Fieber, 1866***Hecalus glaucescens* (Fieber, 1866)****Synonym:** = *aegyptiacus* Signoret, 1879 = *arenarius* Horvath, 1897 = *sulcatus* Fieber, 1866. **Distribution:** BG, CY, GR, IT, S-RU, SC, SL, ES, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 06, 07, 31, 33, 44, 45, 48, 56).Adana prov.: Kozan as *Parabolocratus glaucescens* Fieber, 1866 (Dlabola, 1957); Adıyaman prov., Ankara prov.: Çubuk, Malatya prov., Manisa prov.: Salihi, Muğla prov.: Fethiye, Siirt prov.: Kurtalan (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Adana prov.: Centre, İçel prov.: Erdemli, Alata (Başpınar & Uygun, 1991b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Alanya (Kargıcak), Gündoğmuş (Güneycik), Manavgat (Bucakşeyhler, Belenobası, Centre, Beşkonak, Demirciler, Hacıobası, Taşağıl, Sağırın), Elmalı (Centre, Tekkeköy), Düzlerçamı, Güllükdağı (Demir, 2006c).**Subfamily: APHRODINAE****Genus: *Aphrodes* Curtis, 1833**Synonym: = *Acocephalus* Burmeister, 1835 = *Acucephalus* Germar, 1833 = *Pholetaera* Zetterstedt, 1840

***Aphrodes bicinctus* (Schrank, 1776)**

Distribution: AL, AT, BE, BT, BG, CO, CR, CA, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, ME, MD, NO, PL, PT, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (01, 03, 06, 07, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 28, 30, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67).

Ankara prov.: Baraj, Beynam, Adana prov.: Bütücek, Niğde prov.: Ulukışla (Dlabola, 1957); Afyon prov.: Sincanlı, Ankara prov.: Çubuk, Karagöl, Eymir, Elmadağ, Lalahan, Antalya prov.: Korkuteli, Bilecik: Centre, Pazaryeri, Bursa prov.: Uludağ, Çanakkale prov.: Ezine, Gökçeada, Diyarbakır prov., Edirne prov., Elziğ prov.: Düzönü, Kinderis, Erzincan prov.: Başköy, Çağlayan, Üzümlü, Erzurum prov.: Centre, Uzundere, Gaziantep prov.: Nurgana, Gümüşhane prov.: Centre, Zigana, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Hakkari prov.: Uludere, İstanbul prov., İzmir prov.: Bornova, Dikili, Ilıca, Mordoğan, Ödemiş-Bozdağ, Yamanlar, Kars prov.: Sarıkamış, Kırklareli prov.: Pınarhisar, Vize, Konya prov.: Ereğli, Kütahya prov.: Abide, Domaniç, Simav, Manisa prov.: Akhisar, Centre, Kula, Muğla prov.: Köyceğiz, Marmaris, Ordu prov.: Mesudiye, Ünye, Rize prov.: Centre, Kaçkar dağı, Sakarya prov.: İzmit-Gölcük, Samsun: Centre, Çakallı, Kavak, Çarşamba, Gelemen, Vezirköprü, Sinop prov., Tekirdağ prov.: Centre, Saray, Tokat prov., Trabzon prov.: Akçaabat, Uşak prov., Van prov.: Beyüzümü, Zonguldak prov.: Kurucasıle (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Sapanca gölü (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a).

***Aphrodes makarovi* Zachvatkin, 1948**

Distribution: AT, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LI, NO, PL, M-RU, N-RU, SC, SL, SE, SW, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 10).

Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1991b); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Sey Hamamı, Yasin, Yenimahalle, Soğuksu,) (Demir, 2006b); Antalya: Alanya (Okurcalar), Gündoğmuş (Güneycik), Manavgat (Demirciler, Külçüler, Bucakşeyhler, Yukarışıklar-Tilkiler, Yaylaalan, Tilkiler) (Demir, 2006c).

Genus: *Planaphrodes* Hamilton, 1975***Planaphrodes trifasciatus* (Fourcroy, 1785)**

Synonym: = *laevus* Rey, 1891 = *niger* Kusnezov, 1929.

Distribution: AT, BE, BT, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SE, SW, NL, UA, YU, EP, TR.

Distribution in Turkey: (46).

Maraş prov.: Göksun (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Anoscopus* Kirschbaum, 1868***Anoscopus albifrons* (Linnaeus, 1758)**

Distribution: AL, AT, AO, BI, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, ME, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (07, 35).

İzmir prov.: Mordoğan (Lodos & Kalkandelen, 1982b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

***Anoscopus assimilis* (Signoret, 1879)**

Distribution: AT, CO, FR, DE?, IT, ME, PT, RO, SA, SC, SL, SW, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Güllükdığı (Demir, 2006c).

Subfamily: XESTOCEPHALINAE**Genus: *Xestocephalus* Baker, 1915**

Synonym: = *Lindbergana* Metcalf, 1952 = *Nesotettix* Lindberg, 1936

Xestocephalus guttulatus* (Motschulsky, 1859)*Distribution:** TR, OR, ER.**Distribution in Turkey:** (01, 33).Adana prov.; Karataş as *Xestocephalus guttatus* Motschulsky, 1859 (Dlabola, 1957); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).**Subfamily:** STEGELYTRINAE**Genus: *Stegelytra* Mulsant et Rey, 1855**Synonym: = *Iberia* Kirkaldy, 1907***Stegelytra putoni* Mulsant et Rey, 1875****Distribution:** FR, PT, ES, YU?, TR.**Distribution in Turkey:** (46).

Maraş prov.: Göksun (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Subfamily: CICADELLINAE**Tribe:** EVACANTHINI**Genus: *Evacanthus* Le Peletier et Serville, 1825*****Evacanthus acuminatus* (Fabricius, 1794)****Synonym:** = *acuminalis* Turton, 1802 = *germari* Curtis, 1833 = *interstincta* Fallen, 1806.**Distribution:** AL, AT, BE, BT, BG, CA, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, TR.**Distribution in Turkey:** (08, 28, 29, 35, 53, 55, 58, 60).

Artvin prov.: Hopa, Murgul, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Gümüşhane prov.: Şiran, Zigana, İzmir prov.: Ödemiş-Bozdağ, Rize prov.: Kaçkar dağı, Samsun prov.: Centre, Bafra, Sivas prov.: Suşehri-Ortakent, Tokat prov.: Erbaa (Lodos & Kalkandelen, 1983a).

Subfamily: TYPHLOCYBINAE**Tribe:** ALEBRINI**Genus: *Alebra* Fieber, 1872**Synonym: = *Compsus* Fieber, 1866***Alebra albostriglia* (Fallen, 1826)****Distribution:** AT, AO, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, ME, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 10, 14, 41, 31, 08, 19, 35, 38, 43, 52, 71).

Adana prov.: Tapan, Gavur Dağı (Dlabola, 1957); Tatvan-Bitlis (Dlabola, 1971b); Kırıkkale prov., Artvin prov.: Murgul, Çorum prov.: Centre, Bayat, İzmir prov.: Tire, Kayseri prov.: Erciyes, Ordu prov.: Mesudiye (Lodos & Kalkandelen, 1983b); Sapanca gölü, Karahan Pass, Nurhak Mountain, Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Bahkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Salın, Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler) (Demir, 2006c).

Alebra wahlbergi* (Boheman, 1845)*Distribution:** DZ, AT, BE, BO, MV, SL, DK, FR, DE, GB, HU, IT, NL, NO, PL, SE, SW, TR, LA, MD, M-RU, UA, YU.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Karataş, Kozan (Dlabola, 1957).

Tribe: DIKRANEURINI**Genus: *Liguropia* Haupt, 1930*****Liguropia juniperi* (Lethierry, 1876)****Synonym:** = *menozzii* Haupt, 1930.**Distribution:** CY, FR, DE, GR, IT, S-RU, SA, SC, UA, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 35).Adana prov.: Karapınar as *Dikraneura juniperi* Lethierry, 1876 (Dlabola, 1957); İzmir prov.: Menemen (Lodos & Kalkandelen, 1983b).**Genus: *Micantulina* Anufriev, 1970*****Micantulina (Mulsantina) stigmatipennis* (Mulsant et Rey, 1855)****Synonym:** = *pulcherrimus* Horvath, 1884 = *quadripunctata* Kirschbaum, 1868.**Distribution:** AT, BG, CY, CS, FR, DE, GR, HU, IT, PL, S-RU, SA, SC, SL, ES, UA, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 10, 34, 15, 32, 35, 45, 65).Ankara prov.: Mogan Gölü as *Dikraneura stigmatipennis* Mulsant Rey, 1855 (Dlabola, 1957); İstanbul prov., Ankara prov.: Çubuk, Karagöl, Eymir gölü, Lalahan, Elmadağ, Burdur prov.: Karagent köyü, Yakören, İzmir prov.: Bornova, Manisa: Gölarmara (Lodos & Kalkandelen, 1983b); Topaluşağı, Fırat-Flusses (C-Anatolia), Van prov.: Başkale (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Alanya (Okurcalar, Keşefli), Kaş (Gömbe, Uçarşu, Beldibi), Manavgat (Demirciler, Ilıca, Bucakşeyhler, Örenşehir, Taşağul, Kilimli, Sağrın) Elmalı (Gölova-Bozhöyük, Tekkeköy), Finike (Gökçük), Korkuteli (Beğiş-Karabayır, Korkuteli-Kargalk), Hisarçandır (Demir, 2006c).**Tribe: EMPOASCINI****Genus: *Kybos* Fieber, 1866****Synonym:** *Cybus* Douglas, 1875***Kybos virgator* (Ribaut, 1933)****Synonym:** = *saageri* Wagner, 1935.**Distribution:** AT, BE, BT, BG, CS, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, SA, SL, SE, SW, NL, UA, YU, EP, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 11, 26, 35, 40, 42, 65).Eskişehir-Bilecik (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Çubuk, Eymir gölü, Etimesgut, İzmir prov.: Ödemiş-Bozdağ, Kırşehir prov.: Kaman, Konya prov.: Akşehir, İçeri Çumra, Van prov.: Başkale, Çatak as *Empoasca (Kybos) virgator* Ribaut, 1933 (Lodos & Kalkandelen, 1983c); Ankara prov.: Yenimahalle, Kayağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Antalya prov.: Elmalı (Akçay, Çobanisa, Gümüşyaka, Tekkeköy), Manavgat (Ilıca), Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası) (Demir, 2006c).**Genus: *Empoasca* Walsh, 1862*****Empoasca decipiens* Paoli, 1930****Distribution:** AT, BT, BG, CS, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, NO, PL, RO, M-RU, S-RU, SA, SC, ES, SW, NL, YU, AR, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 33).

Adana prov., İçel prov.: Alata (Dlabola, 1957); East Mediterran region (Başpınar & Uygun, 1991b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Alanya (Kargıcak, Konaklı), Elmalı (Centre, Gümüşyaka), Finike (Evrenkavak, Turunçova, Yeşilyurt), Gazipaşa (Macarköy), Kaş (İslamlar), Kale (Köşkerler), Kemer (Çamyuva, Karabucak), Kumluca (Kavakköy, Kavakdibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Demirciler, Ilıca, Yukarışıklar-Tilkiler, Beşkonak, Karaöz), Serik (Aspendos, Camili) (Demir, 2006c).

***Empoasca solani* (Curtis, 1846)**

Distribution: AL, DZ, AT, BE, BG, BO, MV, SL, DK, FI, FR, DE, GB, IT, SA, MN, MA, NL, PL, PT, RO, ES, SE, SW, TN, TR, GG, KG, MD, M-RU, UA, YU.

Distribution in Turkey: (06, 11, 15, 18, 24, 27, 36, 76, 37, 42, 50, 55, 57, 63, 65).

Ankara prov.: Çubuk, Elmadağ, Lalahan, Eymir gölü, Kayaş, Karagöl, Bilecik prov.: Pazaryeri, Burdur prov.: Ağlasun, Çankırı prov.: Festikhan, Erzincan prov.: Çağlayan, Ilic, Kuruçay, Refahiye, Gaziantep prov.: Nurgana, Kars prov.: Küllük, Kağızman, Iğdır prov., Kastamonu prov.: Ilgaz-Belören, Konya prov.: Ereğli, Kasımhan, Meram, Karaman prov., Nevşehir prov.: Boyalı, Çat, Göreme, Nar, Ürgüp, Samsun prov.: Gelemen, Sinop prov.: Ahmetyeri, Durağan, Kanlıçay, Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Beyüzümü, Edremit, Gevaş (Lodos & Kalkandelen, 1983c).

Genus: *Asymmetrasca* Dlabola, 1958***Asymmetrasca decedens* (Paoli, 1932)**

Distribution: CY, FR, IT, SA, SC, SL, TR, EG, IQ, IL, JO, LY, GG.

Distribution in Turkey: (01, 07, 33, 42).

East Mediterranean region (Başpınar & Uygun, 1991b); Adana prov.: Karataş, Centre, Misis, İçel prov.: Alata, Konya prov.: Beyşehir *Empoasca decedens* Paoli, 1932 (Dlabola, 1957); Antalya prov.: Alanya (Kargıcak, Konaklı), Finike (Turunçova, Yeşilyurt), Gazipaşa (Macarköy), Kaş (İslamlar, Köşkerler), Kemer (Çamyuva, Karabucak), Kumluca (Kavakköy, Kavakdibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Karaöz), Serik (Aspendos, Camili) (Demir, 2006c).

Genus: *Chlorita* Fieber, 1872

Synonym: = *Chloria* Fieber, 1866

***Chlorita brevispina* Linnavuori, 1965**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (31).

Hatay prov. (Linnavuori, 1965)

***Chlorita paolii* (Ossiannilsson, 1939)**

Distribution: AT, BG, CS, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, PL, M-RU, N-RU, S-RU, SL, NL, UA, YU, EP, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.as *Asymmetrasca paolii* Ossiannilsson, 1939 (Lodos & Kalkandelen, 1983c).

Tribe: TYPHLOCYBINI**Genus: *Edwardsiana* Zachvatkin, 1929*****Edwardsiana rosae* (Linnaeus, 1758)**

Synonym: = *lactifera* Rey, 1894 = *manca* Ribaut, 1936 = *subcarnea* Rey, 1894.

Distribution: AT, BE, BT, BG, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SC, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 42, 70, 46, 50, 51).

Esendere-Yüksekova (Dlabola, 1971b); Adana prov.: Hasanbeyli, Pozanti, Ankara prov.: Çubuk, Kayaş, Lalahan, Konya prov.: Centre, Karaman prov., Maraş prov.: Tekir, Nevşehir prov.: Ürgüp, Niğde prov.: Bor (Lodos & Kalkandelen, 1984a); Pınarbaşı (Dlabola, 1981).

***Edwardsiana tshinari* Zachvatkin, 1947**

Distribution: MD, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 34, 41).

İzmit-Düzce, Üsküdar-İzmit (Dlabola, 1971b); Antalya prov.: Kemer (Ovacık) (Demir, 2006c).

Genus: *Lindbergina* Dlabola, 1958

Synonym: = *Youngia* Dlabola, 1958 = *Youngiada* Dlabola, 1959

Lindbergina tarsalis* Linnavuori, 1962*Distribution:** IL, TR.**Distribution in Turkey:** (31).

Hatay prov. (Linnavuori, 1965).

Genus: *Ribautiana* Zachvatkin, 1947***Ribautiana cruciata* (Ribaut, 1931)****Distribution:** BE, BT, BG, FR, GR, IT, PT, S-RU, SA, SW, EP, NA, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

Genus: *Eurhadina* Haupt, 1929***Eurhadina ribauti* Wagner, 1935****Synonym:** = *umbrata* Ribaut, 1936.**Distribution:** AT, BE, BT, CY, DK, FI, FR, DE, GR, N-AE, NO, S-RU, SE, SW, NL, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov. (Kartal, 1983).

Genus: *Eupteryx* Curtis, 1833***Eupteryx cypria* (Ribaut, 1948)****Distribution:** CY, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07).

Adana prov.: Gavur Dağı (Dlabola, 1957); Antalya prov.: Alanya (Obaköy), Finike (Erenkavak), Kale (Eseler), Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Manavgat (Demirciler, Karaöz) (Demir, 2006c).

Eupteryx fahringeri* Melichar, 1911*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (07, 16, 35).

Bursa prov.: Uludağ (Fahringer, 1922); Bursa prov.: Uludağ, İzmir: Ödemiş-Bozdağ (Lodos & Kalkandelen, 1984b); Bursa prov. (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Kaş (Gömbe, Uçarsu) (Demir, 2006c).

Eupteryx gyaurdagicus* Dlabola, 1957*Distribution:** CR, GR, NE, CR, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 03, 06, 07, 14, 31, 32, 35, 45, 50, 57).

Adana prov.: Gavur Dağı (Dlabola, 1957); Bitlis-Baykan, Keçiözümlü-İzmir, Afyon, Dörttyol (Dlabola, 1971b); Bolu prov.: Abant (Kartal, 1983); Ankara prov.: Çubuk, Karagöl, Kayaş, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ, Eymir gölü, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Bornova, Kozak, Kemalpaşa, Ödemiş-Bozdağ, Manisa prov.: Gölmarmara, Nevşehir prov.: Nar, Ürgüp, Sinop prov.: Boyabat, Kanlıçay (Lodos & Kalkandelen, 1984b); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Yenimahalle, Aköz, Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası) (Demir, 2006c).

Eupteryx insulana* (Ribaut, 1948)*Distribution:** CY, GR, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

Tribe: ZYGINELLINI**Genus: *Zyginella* Löw, 1885**

Zyginella pulchra* Löw, 1885*Synonym:** = *quercus* Kusnezov, 1930.**Distribution:** AT, BG, CY, CS, FR, DE, GR, IT, PL, S-RU, SA, SC, SW, UA, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 31, 21, 35, 42, 68, 55).

Diyarbakır prov.: Centre, İzmir prov.: Karaburun, Kemalpaşa, Tire, Konya prov.: Tuz gölü, Aksaray prov., Samsun prov.: Centre (Lodos & Kalkandelen, 1984a); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva, Ovacık) (Demir, 2006c).

Tribe: ERYTHRONEURINI**Genus:** *Hauptidia* Dworakowska, 1970***Hauptidia cretacea* (Moravskaja, 1948)****Synonym:** = *furcata* Dlabola, 1957.**Distribution:** S-RU, UA, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 24).

Adana prov.: Pozanti, Ankara prov.: Çubuk, Elmadağ, Eymir gölü, Lalahan, Kızılcahamam, Erzincan prov.: Demirpınar (Lodos & Kalkandelen, 1984c).

Hauptidia rivularis* (Linnavuori, 1962)*Distribution:** IL, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Kemer (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Zyginidia* Haupt, 1929**Synonym:** = *Idia* Fieber, 1866***Zyginidia sohrab* Zachvatkin, 1947****Synonym:** = *coacta* Ribaut, 1948.**Distribution:** CY, GR, S-RU, UA, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 07, 12, 13, 21, 23, 27, 30, 36, 76, 44, 56, 63, 65).Adana prov.: Karataş as *Erythroneura coacta* Ribaut, 1948 (Dlabola, 1957); İzmit-Düzce, Üsküdar-İzmit, Bitlis-Reşadiye, Reşadiye-Tatvan, Tatvan-Bitlis, Van-Bitlis (Dlabola, 1971b); Adıyaman prov.: Besni, Gerger, Bingöl prov.: Genç, Bitlis prov.: Kermete, Diyarbakır prov.: Centre, Çermik, Çüngüş, Ergani, Silvan, Elazığ prov.: Sivrice, Gaziantep prov.: Nurgana, Hakkari prov., Kars prov.: Kağızman prov., Iğdır prov., Malatya prov.: Akçadağ, Centre, Hasırçılar, Pötürge, Siirt prov.: Şirvan, Urfa prov.: Birecik, Ceylanpınar, Van prov.: Elmalı (Lodos & Kalkandelen, 1984d); Antalya prov.: Alanya (Konaklı, Okurcalar), Aksu (Topallar), Finike (Erenkavak, Yeşilyurt), Kale (Eseler), Gazipaşa (Macarköy), Kemer (Böğürtlenözü, Çamyuva, Karabucak), Kumluca (Kavakköy), Serik (Camili) (Demir, 2006c).**Genus:** *Zyginia* Fieber, 1866**Synonym:** = *Flammigeroidia* Dlabola, 1958***Zyginia discolor* Horvath, 1897****Distribution:** BG, FR, GR, IT, MD, SA, SC, SL, SW, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 35).Esendere-Yüksekova as *Flammigeroidia discolor* Horvath, 1897 (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Çubuk, İzmir prov.: Kemalpaşa, Menemen (Lodos & Kalkandelen, 1984d); Balaban as *Zyginia (Flammigeroidia) discolor* Horvath, 1897 (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).***Zyginia karatasa* (Dlabola, 1957)****Distribution:** AF, JO, TR.**Distribution in Turkey:** (01).Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1991b); Adana prov.: Karataş as *Erythroneura karatasa* sp.n. (Dlabola, 1957).

Zygina ordinaria* (Ribaut, 1936)*Synonym:** = *pandellei* Ribaut, 1936 = *variegata* Ribaut, 1936.**Distribution:** AT, BT, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, IT, LA, LI, NO, PL, PT, RO, SE, SW, YU, EP, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 54).

Adana prov.: Pozanti, Adapazarı prov.: Yağbasan (Lodos & Kalkandelen, 1984d).

Zygina tithide* Ferrari, 1882*Distribution:** AT, BG, CS, DE, GR, HU, IT, PL, SW, UA, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (15).

Burdur prov.: Karakent köyü (Lodos & Kalkandelen, 1984d).

Genus: *Arboridia* Zachvatkin, 1946***Arboridia adanae* (Dlabola, 1957)****Distribution:** IL, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 20, 21, 27, 38, 50, 51, 71).Adana prov.: Tapan, Abacılar, Centre as *Erythroneura adanae* spn. (Dlabola, 1957); Adana prov.: Ahmetli, Pozanti, Ankara prov.: Çubuk, Tuzgözü, Kırıkkale prov., Denizli prov.: Buldan, Diyarbakır prov., Gaziantep prov.: İslahiye, Kayseri prov.: İncesu, Yeşilhisar, Nevşehir prov.: Ürgüp, Niğde prov.: Ulukışla (Lodos & Kalkandelen, 1984c); Antalya prov.: Kemer (Karabucak), Kumluca (Kavakdibi), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).**Genus: *Fruticidia* Zachvatkin, 1946****Synonym:** = *Frutioidia* auct.***Fruticidia bisignata* (Mulsant et Rey, 1855)****Synonym:** = *bactriana* Zachvatkin, 1947.**Distribution:** AT, BG, CY, FR, DE, GR, IT, PT, S-RU, SA, ES, SW, UA, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 18, 28, 32, 35, 50, 67, 78).Adana prov.: Tapan, Abacılar, Centre as *Erythroneura bisignata* Mulsant Rey, 1855 (Dlabola, 1957); Adana prov.: Hasanbeyli, Çankırı prov.: Ilgaz, Giresun, Isparta prov.: Kayı village, İzmir prov.: Kemalpaşa, Nevşehir prov.: Centre, Karabük prov. (Lodos & Kalkandelen, 1984c).***Fruticidia sanguinosa* (Rey, 1891)****Synonym:** = *picta* Melichar, 1896.**Distribution:** FR, DE, IT, SC, YU?, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07).Adana prov.: Abacılar as *Erythroneura sanguinosa* Rey, 1891 (Dlabola, 1957); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).**Genus: *Helionidia******Helionidia himyarita* Zachvatkin, 1946****Distribution:** IR, IQ, IL, TR, ER.**Distribution in Turkey:** (01, 33).Adana prov.: Misis, Centre, Karataş, Abacılar, Kozan, İçel prov.: Alata as *Erythroneura (Helionidia) himyarita* Zachvatkin, 1946 (Dlabola, 1957); Fevzipaşa-Mersin, Mersin-Silifke as *Helionidia (Tamaricella) himyarita* (Dlabola, 1971b).**Genus: *Tamaricella* Zachvatkin, 1946*****Tamaricella cypria* (Ribaut, 1948)****Distribution:** CY, IL, EG, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 44, 71).

Ankara prov.: Eymir gölü, Kırıkkale prov. (Lodos & Kalkandelen, 1984c); Malatya prov.: Darende, Balaban (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Kemer (Bögürtlenözü), Manavgat (Taşağıl) (Demir, 2006c).

Subfamily: DELTOCEPHALINAE**Tribe: GRYPOTINI****Genus: *Grypotes* Fieber, 1866**Synonym: = *Protaenia* Thomson, 1869***Grypotes staurus* Ivanoff, 1855**Synonym: = *australis* Haupt, 1927.**Distribution:** CI, CY, FR, GR, IT, PT, SA, SC, UA, YU, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 31, 35, 42, 48, 55, 57).

Hatay prov.: Yayladağı-Belen (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Ağapınarı, Kozan, Suluhan (Dlabola, 1957); İzmir prov.: Yamanlar, Konya prov.: Ermenek, Muğla prov., Samsun prov.: Bafra-Alaçam (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Samsun prov.: Yakakent Çamgözü, Sinop: Dranaz Dağı (Zeybekoğlu, 1994, 1998); Antalya prov.: Alanya (Kestel, Keşefli), Kaş (İslamlar), Kemer (Böğürtlenözü, Çamyuva, Karabucak), Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler, Taşağıl, Kilimli), Serik (Sarıbalı) (Demir, 2006c).

Tribe: GONIAGNATHINI**Genus: *Goniagnathus* Fieber, 1866*****Goniagnathus bolivari* (Melichar, 1907)**Synonym: = *hoberlandti* Dlabola, 1957.**Distribution:** BG?, GR, ES, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 50, 63).Adana prov.: Pozanti (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Gavur Dağı, Ankara prov.: Beynam, Edirne prov.as *Goniagnathus hoberlandti* sp.n. (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Lalahan, Nevşehir prov.: Avanos, Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1985a).***Goniagnathus brevis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**Synonym: = *annulipes* Lucas, 1849.**Distribution:** AL, AT, BE, BG, CY, CS, TR, FR, DE, GR, HU, IT, MD, PL, PT, RO, S-RU, SC, SL, ES, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC.**Distribution in Turkey:** (01, 05, 06, 07, 15, 21, 45, 47, 51, 55, 57, 60).

Ankara prov.: Beynam, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Çubuk Barajı I, Elmadağ, Lalahan, Eymir Gölü (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Çubuk Barajı I., Elmadağ, Eymir gölü, Lalahan, Burdur prov., Diyarbakır prov., Manisa prov.: Akhisar, Mardin prov.: Midyat, Niğde prov.: Çiftahan, Samsun prov.: Bafra-Karaköy (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1991b); Amasya prov., Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy, Geriş), Düzlerçamı, Gündoğmuş (Çiçekoluk, Serinyaka), Manavgat (Tilkiler, Yukarışıklar-Tilkiler) (Demir, 2004b); Ankara: Kızılcahamam (Güvem, Eyrekkaya, Salin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara: Sincan Mülk (Demir, 2007b).

***Goniagnathus guttulinervis* (Kirschbaum, 1868)**Synonym: = *ferganensis* Kusnezov, 1929 = *laminatus* Ivanoff, 1885 = *putoni* Lethierry, 1874.**Distribution:** BI, CI, FR, GR, HU, IT, PT, S-RU, SA, SC, ES, NL?, UA, AR, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Alanya Kargıcak, Manavgat: Bucakşeyhler, Çayyazı, Demirciler, Örenşehir (Demir, 2004b).

Tribe: OPSIINI**Genus: *Opsius* Fieber, 1866**Synonym: = *Cestius* Distant, 1908

Opsius cypriacus* Lindberg, 1958*Distribution:** CY, GR, UA, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 05, 06, 07, 71, 08, 09, 21, 22, 24, 25, 35, 43, 44, 45, 50, 55, 56, 65, 66).

Adana prov.: Pozantı (Linnavuori, 1965); Amasya prov.: Osmaniç, Ankara prov.: Etimesgut, Kırıkkale prov., Artvin prov., Aydın prov.: Söke-Samsundağı, Diyarbakır prov.: Centre, Edirne prov.: Enez, Erzincan prov.: Ilıç, Erzurum prov.: Centre, Horasan, Tortum, İzmir prov.: Karşıyaka, Karaburun, Mordoğan, Kütahya prov.: Domaniç, Manisa prov.: Akhisar, Alaşehir, Gölarmara, Nevşehir prov.: Avanos, Gülşehir, Samsun prov.: Kavak, Siirt prov.: Kozlu, Van prov.: Başkale, Yozgat prov.: Çekerek, Yerköy (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Malatya prov.: Darende (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Manavgat (Hacıobası, Örenşehir, Taşağul, Sağırin) (Demir, 2006c).

Opsius lethierryi* Wagner, 1942*Distribution:** AF, DZ, BG, CI, EG, FR, CO, IQ, IT, SA, ME, MA, TN, TR, YU.**Distribution in Turkey:** (06, 42, 45).

Feke Toros, Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1957); Konya prov., Manisa prov. (Lodos & Kalkandelen, 1985)

Opsius smaragdinus* Emeljanov, 1964*Distribution:** UA, TR.**Distribution in Turkey:** (07, 50).

Nevşehir prov.: Gülşehir (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).

Opsius stactogalus* Fieber, 1866*Synonym:** = *heydeni* Fieber, 1872 = *spinulosus* Della Guistina, 1981 = *tamaricis* Kirschbaum, 1868.**Distribution:** AT, AO, BI, BE, BT, BG, CI, CO, CR, CY, CS, FR, DE, GR, HU, IT, MD, NO, PT, RO, S-RU, SA, SC, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 71, 50, 35, 44, 55, 57).

Ankara prov.: Etimesgut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara-Kırıkkale, Nevşehir prov.: Avanos, Gülşehir, İzmir prov.: Karşıyaka (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Centre (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Malatya prov.: Balaban (Dlabola, 1981); Samsun prov., Sinop prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Kale (Beymelek), Manavgat (Centre), Serik (Aspendos, Köprüçayı) (Demir, 2006c).

Genus: *Orosius* Distant, 1918***Orosius orientalis* (Matsumura, 1914)****Synonym:** = *albicinctus* Distant, 1918 = *filigranus* Haupt, 1927.**Distribution:** CI, GR, PT, ES, AR, EP, NE, N-AC, OR, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 33, 35, 48, 50, 63).

Adana prov.: Karataş, Kozan, Ağapınarı, Centre, Misis, Abacılar, İçel prov.: Alata as *Orosius filigranus* Haupt, 1927 (Dlabola, 1957); İzmir prov.: Bornova, Muğla prov.: Fethiye, Nevşehir prov.: Boyalı, Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Adana prov.: Balcalı, Karataş (Başpınar & Uygun, 1991c); Antalya prov.: Kumluca (Kavakköy), Manavgat (Bucakseyhler, Demirciler, Hacıobası, Örenşehir) as *Orosius albicinctus* Distant, 1918 (Demir, 2006c).

Genus: *Circulifer* Zachvatkin, 1935***Circulifer haematoceps* (Mulsant et Rey, 1855)****Distribution:** AT, CY, CS, FR, GR, HU, IT, ME, PL, RO, S-RU, SA, SC, SL, ES, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 04, 06, 07, 13, 30, 33, 42, 50, 48, 65, 68).

Aksaray prov., Ankara prov.: Hirfanlı as *Neoaliturus haematoceps* ssp. *opacipennis* Leth. (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Kozan, Gavur Dağı, Bürücek, Karataş, Centre, Ankara prov.: Mogan Gölü, Hasanoğlu, İçel prov.: Erdemli as *Circulifer opacipennis* Lethierry,

1876 (Dlabola, 1957); Esendere-Yüksekova, Başkale-Van, Bitlis-Baykan, Van-Bitlis, Hakkari-Başkale, Van prov., Tatvan-Bitlis, Mersin-Silifke, Başkale-Van as *Neoliturus opacipennis* Lethierry, 1876 (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Polatlı, Kayaş, Lalahan, Elmadağ, Çubuk, Çubuk Barajı, Karagöl, Eymir Gölü, Atatürk Orman Çiftliği, Şereflikoçhisar, Konya prov.: Ereğli, Nevşehir prov.: Bağcılık İstasyonu, Ürgüp, Nar, Çardak, Avanos, Boyalı, Göreme, Muğla prov.: Fethiye as *Neoliturus opacipennis* Lethierry, 1876 (Kalkandelen, 1974); "unlimited specimens that collected nearly all over in Turkey" as *Circulifer opacipennis* Lethierry, 1876 (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Sapanca gölü, Gülşehir (Kızılırmak ovası, Ürgüp, Bünyan, Gürün, Pülümür Pass, Mercan dağ (Munzur), Kandilli, Tahir geçidi, Camak dağ (Aras dağları), Ağrı, 16 km N Başkale, Erdemli as *Neoliturus haematoceps* (Mulsant Rey, 1855) (Dlabola, 1981); İçel prov.: Doğankent, Tecirli, Alata, Adana: Kadirli, Çukurköprü as *Circulifer opacipennis* Lethierry, 1876 (Başpınar & Uygun, 1991c); Hakkari prov.: Yenimahalle, Dize, Kıran, Güllüce, Güngör, Yüksekova, Güçlü, Yukarı Ölçek (Kartal et al., 2001); Ankara prov.: Yenimahalle, Kayağdıdağı (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Alanya (Okurcalar), Gündoğmuş (Serinyaka), Kale (Köşkerler), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Demirciler, Hacıobası) (Demir, 2006c).

Genus: *Neoliturus* Distant, 1918

Synonym: = *Distomotettix* Ribaut, 1938

***Neoliturus fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1834)**

Distribution: AL, AT, BI, BE, BG, CI, CY, CS, DK, E-TR, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, PL?, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, ES, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 04, 05, 06, 07, 14, 19, 21, 25, 28, 33, 35, 76, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 63, 65, 68).

Aksaray prov., Gülek (Linnavuori, 1965); Amasya prov., Giresun prov., Ordu prov., Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998); Ankara prov.: Çamlıdere, Işıklıdağı, Baraj, Mogan Gölü, Adana prov.: Bürücek, Karataş, Kozan, Edirne prov.as *Circulifer fenestratus* Herrich-Schaeffer, 1834 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Çubuk Barajı, Lalahan, Hasanoğlan, Eymir Gölü, Atatürk Orman Çiftliği, Ankara-Polatlı (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Tendürek dağı, Ankara: Centre, Bağlum, Çubuk, Eymir gölü, Hasanoğlan, Lalahan, Polatlı, Çorum prov.: Bayat, Diyarbakır prov., Erzurum prov.: Aşkale, Hasankale, İspir, Uzundere, İçel prov.: Tarsus, İzmir prov.: Bornova, Iğdır prov., Mardin prov.: Cizre, Nevşehir prov.: Gülşehir, Urfa prov.: Harran, Van prov.: Çatak (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Sapanca gölü, Bolu prov.: Gerede, Bolu dağları, Gülşehir, Ürgüp, Gürün, Topaluşağı (Dlabola, 1981); Adana prov.: Balcalı, Misis (Başpınar & Uygun, 1991c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Yukarıçanlı) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Gündoğmuş (Ççekoluk, Serinyaka), Güllükdığı, Kumluca (Kavakköy), Manavgat (Beşkonak, Bucakşeyhler, Seleukeia, Demirciler, Çayyazı), Serik (Camili) (Demir, 2006c).

***Neoliturus guttulatus* (Kirschbaum, 1868)**

Distribution: CS, FR, DE, GR, HU, IT, UA, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 21, 35, 76, 50, 60, 63, 42, 70).

Adana prov.: Karataş, Kozan, Misis, Gavur Dağı, Bürücek, Centre, Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam as *Circulifer guttulatus* Kirschbaum, 1868 (Dlabola, 1957); Bitlis-Reşadiye (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Karagöl, Etimesgut, Nevşehir prov.: Ürgüp, Karaman prov. (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Etimesgut, Karagöl, Kazan, Diyarbakır prov., İzmir prov.: Bornova, Iğdır prov., Nevşehir prov.: Gülşehir, Ürgüp, Çat, Tokat prov.: Erbaa, Urfa prov.: Ceylanpınar, Karaman prov. (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Sey Hamamı) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).

***Neoliturus pulcher* (Haupt, 1927)**

Distribution: IR, IL, GG, KG, TJ, TR.

Distribution in Turkey: (07, 21, 48).

Diyarbakır prov., Muğla prov. (Lodos & Kalkandelen, 1985a); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

Tribe: MACROSTELINI**Genus: *Nesoclutha* Evans, 1947**Synonym: = *Irinula* Ribaut, 1948***Nesoclutha erythrocephala* (Ferrari, 1882)****Synonym:** = *flaveolus* Matsumura, 1908 = *wagneri* Lindberg, 1954.**Distribution:** CI, FR, GR, ME, ES, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 05, 07, 60).Adana prov.: Kozan as *Irinula erythrocephala* Ferrari, 1882 (Dlabola, 1957); Amasya prov., Tokat prov. as *Irinula erythrocephala* Ferrari, 1882 (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).**Genus: *Cicadulina* China, 1926*****Cicadulina bipunctata* (Melichar, 1904)****Synonym:** = *bipunctella* Matsumura, 1908 = *zeae* China, 1926.**Distribution:** CI, CY, GR, ME, AR, AS, EP, NE, N-AC, OR, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 07, 33, 35).Adana prov.: Kozan, Abacılar, Centre, Karataş, İçel prov.: Alata as *Cicadulina zeae* China, 1928 (Dlabola, 1957); Fevzipaşa-Mersin *Cicadula bipunctella bipunctella* Matsumura, 1908 (Dlabola, 1971b); Adana prov.: Centre, Ceyhan, Karataş, İçel prov.: Tarsus, İzmir prov.: Karaburun, Narlıdere as *Cicadulina bipunctella* Matsumura, 1908 (Lodos & Kalkandelen, 1985b); İçel prov.: Erdemli as *Cicadulina bipunctella* Matsumura, 1908 (Dlabola, 1981); East Mediterranean region as *Cicadulina bipunctella* Matsumura, 1908 (Başpınar & Uygun, 1991c); Antalya prov.: Alanya (Kestel, Konaklı, Obaköy, Okurcular), Aksu (Topalllar), Finike (Erenkavak, Turunçova, Yeşilyurt), Gazipaşa (Macarköy), Gündoğmuş (Güneycik), Kaş (İslamlar, Kalkan, Yeşilköy), Kale (Eseler), Kemer (Böğürtlenözü, Karabucak, Ovacık, Çamyuva), Kumluca (Kavakköy, Kavakdibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Demirciler, Çakış, Karaöz, Ilca, Örenşehir, Taşağıl), Serik (Camili, Sarıbalı) (Demir, 2006c).**Genus: *Balclutha* Kirkaldy, 1900**Synonym: = *Balcluthina* Singh-Pruthi, 1930 = *Gnathodus* Fieber, 1866 = *Nesosteles* Kirkaldy, 1906***Balclutha frontalis* (Ferrari, 1882)****Synonym:** = *flava* Haupt, 1927 = *haupti* Metcalf, 1955 = *pallidulus* Matsumura, 1908 = *pulchella* Lindberg, 1948 = *rosea* Scott, 1876.**Distribution:** AL, BE, CI, CO, CY, FR, GR, IT, ME, SC, ES, AR, NE, NA, NR, N-AC, OR, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 31, 01, 07, 21, 33, 35, 42, 50, 70, 80).Adana prov.: Karataş, Gavur Dağı, Kozan, Centre, İçel prov.: Alata as *Balclutha pulchella* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1957); Hatay prov.: İskenderun as *Balclutha rosea* Scott, 1876 (Linnavuori, 1965); Fevzipaşa-Mersin as *Balclutha rosea* Scott, 1876 (Dlabola, 1971b); Adana prov.: Osmaniye prov., Diyarbakır prov., İçel prov.: Tarsus, İzmir prov.: Karaburun, Narlıdere, Konya prov.: İçeri Çumra, Karaman prov., Nevşehir prov.: Ürgüp as *Balclutha rosea* Scott, 1876 (Lodos & Kalkandelen, 1985b); İçel prov.: Erdemli as *Balclutha rosea* (Scott, 1876) (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Alanya (Kargıcak, Okurcular, Yeşilköy), Finike (Turunçova), Gazipaşa (Çalıpınar, Çalıpınar-Kahyalar), Gündoğmuş (Güneycik), Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Kemer (Centre), Manavgat (Centre, Bucakşeyhler, Beşkonak, Taşağıl, Kilimli, Sağırın, Demirciler, Külcüler, Karaöz, Örenşehir) as *Balclutha rosea* Scott, 1876 (Demir, 2006c).***Balclutha hebe* (Kirkaldy, 1906)****Synonym:** = *hortensis* Lindberg, 1948 = *virescens* Haupt, 1927.**Distribution:** CI, CY, AR, AS, NE, NA, NR, N-AC, OR, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 06, 07, 13, 15, 21, 23, 27, 33, 42, 70, 44, 47, 48, 50, 63).

Adana prov.: Kozan, Ağapınarı, Centre, Karataş, Ankara prov.: Beynam as *Balclutha hortensis* Lindberg, 1948 (Dlabola, 1957); Fevzipaşa-Mersin, Mersin-Silifke (Dlabola, 1971b); Adana prov.: Centre, Misis, Ceyhan, Yarbaşı, Adıyaman prov.: Besni, Gerger, Ankara prov.: Centre, Eymir, Bitlis prov.: Hizan, Burdur prov.: Ağlasun, Diyarbakır prov.: Centre, Çermik, Çüngüş, Ergani, Silvan, Elazığ prov.: Sivrice, Gaziantep prov.: Nurgana, İcel prov.: Tarsus, Konya prov.: Ereğli, Karaman prov., Karapınar, Meram, Malatya prov.: Centre, Pötürge, Mardin prov.: İdil, Yeşilli, Muğla prov.: Dalaman, Nevşehir prov.: Boyalı, Çat, Göreme, Nar, Ürgüp, Urfa prov.: Siverek, Ceylanpınar, Harran (Lodos & Kalkandelen, 1985b); İcel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); East Mediterran region (Başpınar & Uygun, 1991c); Antalya prov.: Alanya (Obaköy), Gazipaşa (Asarcık), Gündoğmuş (Güneycik), Kemer (Böğürtlenözü, Ovacık), Manavgat (Bucakşeyhler, Boztepe, Çakış, Demirciler, Hacıobası, Taşağıl), Serik (Dikmen) (Demir, 2006c).

***Balclutha pellucens* Horvath, 1909**

Synonym: = *viridella* Lindberg, 1941.

Distribution: AO, CI, ME, TR.

Distribution in Turkey: (04, 02, 05, 06, 08, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 36, 76, 47, 55, 65).

Ağrı prov.: Tutak-Patnos, Adıyaman prov., Amasya prov., Ankara prov.: Centre, Çubuk, Karagöl, Kayaş, Eymir, Elmadağ, Hasanoğlan, Lalahan, Şereflikoçhisar, Artvin prov.: Seyitler, Bitlis prov.: Centre, Reşadiye, Bolu prov.: Kıbrısçık, Seben, Burdur prov.: Karagent Köyü, Çankırı prov.: Çatalema, Diyarbakır prov.: Centre, Devegeçidi, Elazığ prov.: Gezin, Erzincan prov.: Altıntepe, Bahçeliköy, Çağlıyan, Ilıç, Sakaltutan, Üzümlü, Erzurum prov.: Hasankale, İspir, Serçemederesi, Tortum, Hakkari prov.: Yüksekova, Kars: Gaziler, Sarıkamış, Iğdır prov., Mardin prov.: Sultanşehmuz, Yukarıkonak, Samsun prov.: Kavak, Çakallı, Van prov.: Akköprü, Beyüzümü, Elmalı, Güzeldere, Başkale, Kırkgeçit (Lodos & Kalkandelen, 1985b).

***Balclutha punctata* (Fabricius, 1775)**

Distribution: AF, AL, DZ, AT, BG, CY, BO, MV, SL, DK, FI, FR, DE, GR, GB, HU, IE, IT, SA, SC, KP, MN, NL, NO, PL, SE, SW, TN, TR, AM, AZ, EE, GG, KG, KK, LA, MD, N-RU, S-RU, M-RU, UA, UZ, AS, NA, OR.

Distribution in Turkey: (02, 05, 06, 08, 13, 14, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 76, 52, 53, 55, 57, 61). Ankara prov.: Mogan, Beynam (Dlabola, 1957); Adıyaman prov.: Nemrut Mountain, Ankara prov.: Çubuk, Eymir, Karagöl, Bitlis prov.: Centre, Çukur, Bolu prov.: Gerede, Kıbrısçık, Seben, Diyarbakır prov., Erzincan prov.: Dumanlıdağ, Refahiye, Erzurum prov.: Hasankale, Uzundere, Isparta prov.: Eğirdir, Iğdır prov., Sinop prov.: Boyabat (Lodos & Kalkandelen, 1985b); East Mediterranean region (Başpınar & Uygun, 1991c); Amasya prov., Artvin prov., Giresun prov., Ordu prov., Rize prov., Samsun prov., Sinop prov., Trabzon prov. (Zeybekoğlu, 1998); Hakkari prov.: Güllüce, Yenimahalle, Güçlü (Kartal et al., 2001).

***Balclutha rhenana* Wagner, 1939**

Distribution: AT, BG, CS, FI, DE, GR?, SL, SW, NL, YU, EP, TR.

Distribution in Turkey: (07, 10, 25, 33, 44, 65).

Erzurum prov.: Uzundere (Lodos & Kalkandelen, 1985b); Malatya prov.: Balaban, Van: 16 km N Başkale, 30 km N Başkale, İcel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Antalya prov.: Finike (Turunçova, Yeşilyurt), Kaş (İslamlar), Kemer (Böğürtlenözü, Çamyuva), Kumluca (Kavakdibi) (Demir, 2006c).

***Balclutha saltuella* (Kirschbaum, 1868)**

Synonym: = *angustus* Then, 1886 = *quadriguttatus* Matsumura, 1908.

Distribution: BG, CS, FR, DE, GR, HU, IT, RO, SC, SL, SW, YU, TR. **Distribution in Turkey:** (13, 27, 33).

Bitlis-Reşadiye, Fevzipaşa-Mersin (Dlabola, 1971b).

Genus: *Macrosteles* Fieber, 1866

Synonym: = *Acrostigmus* Thomson, 1869

Macrosteles chobauti* Ribaut, 1952*Distribution:** BG, FR, GR, TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Şihmurat (Başpınar & Uygun, 1991c).

Macrosteles fieberi* (Edwards, 1889)*Synonym:** = *frontalis* Fieber, 1885.**Distribution:** AT, BT, BG, CS, FI, FR, DE, GR?, IE, MD, NO, PL, RO, S-RU, SL, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 04, 06, 07, 13, 14, 30, 42, 50, 65, 70).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Adana prov.: Karataş (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Çubuk, Eymir gölü, Ankara-Elmadağ, Hasanoğlan, Etimesgut, Atatürk Orman Çiftliği, Karaman prov., Konya prov.: Meram, Nevşehir prov.: Göreme, Avanos (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Doğubeyazıt, Patnos, Ankara prov.: Kazan, Bitlis prov.: Reşadiye, Çankırı prov.: İnandık, Karaömer, Konak, Bolu prov.: Düzce, Dörtdivan, Seben, Konya. Ereğli, Van prov.: Başkale, Beyüzümü, Elmalı, Erciş (Lodos & Kalkandelen, 1985b); Bolu prov.: Gerede, Bolu dağları, Van prov.: Gevaş, Van gölü (Dlabola, 1981); Hakkari prov.: Güllüce, Güçlü, Yukarı Ölçek, Dize (Kartal et al., 2001); Antalya prov.: Elmalı, Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Macrosteles forficula* (Ribaut, 1927)*Distribution:** BG, FR, GR, IT, PT, ES, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 05, 06, 07, 14, 24, 25, 55, 57, 65).

Adana prov.: Kızılviran, Bürrücek (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Eymir gölü, Elmadağ, Lalahan, Hasanoğlan (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Nallıhan, Bolu prov.: Kırıbsıcık, Seben, Erzincan prov.: Ilıç, Refahiye, Erzurum prov.: Tufanç köyü, Uzundere (Lodos & Kalkandelen, 1985b); Bolu prov.: Gerede, Bolu dağları, Van prov.: Gevaş, Van gölü (Dlabola, 1981); Amasya prov.: Akdağ, Borabay, Taşova, Samsun prov.: Ladik, Sinop prov.: Boyabat, Gerze (Zeybekoğlu, 1993, 1998); Antalya prov.: Finike (Erenkavak), Kemer (Çamyuva, Karabucak), Kumluca (Kavakköy) (Demir, 2006c).

Macrosteles laevis* (Ribaut, 1927)*Distribution:** AL, AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IC, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 03, 05, 06, 08, 28, 50, 15, 30, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 65, 70).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Adana: Kızılviran, Afyon prov.: Sultan Dağı (Dlabola, 1957); Sungurlu-Merzifon, Hakkari-Başkale, Van-Bitlis, Bitlis-Reşadiye, Bitlis-Baykan (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Çubuk Barajı, Eymir Gölü, Ankara-Elmadağ, Kayaş, Lalahan, Hasanoğlan, Atatürk Orman Çiftliği, Etimesgut, Burdur prov.: Karagent, Nevşehir prov.: Ürgüp, Nar, Çardak, Avanos, Çat, Göreme, Konya prov.: Meram, Kasımhan, Ereğli, Karaman prov. (Kalkandelen, 1974) ; “unlimited specimens were collected nearly all over in Turkey” (Lodos & Kalkandelen, 1985b); Sapanca gölü, Balaban, 16 km N Başkale, 30 km N Başkale (Dlabola, 1981); Amasya prov.: Akdağ, Ordu prov.: Çambaşı, Samsun prov.: Çamgölü, Çarşamba, Kocadağ, Ladik, Sinop: Gerze (Zeybekoğlu, 1993, 1998); Hakkari prov.: Güllüce (Kartal et al., 2001).

Macrosteles quadripunctulatus* (Kirschbaum, 1868)*Synonym:** = *ramigera* Zachvatkin, 1933.**Distribution:** AT, BT, BG, CS, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, PL, RO, M-RU, S-RU, SC, SL, SE, SW, NL, UA, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 02, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 42, 44, 45, 50, 52, 55, 64, 65, 67, 80).

Ankara prov.: Hasanoğlan, Adana prov.: Kozan (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Isparta prov.: Yakiören, Nevşehir prov.: Ürgüp, Nar, Avanos, Göreme, Konya prov.: Meram, Ereğli (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Centre, Osmaniye prov., Adıyaman prov.: Gerger, Ağrı: Doğubeyazıt, Patnos, Ankara prov.: Çubuk, Çamlıdere, Mogan gölü, Bingöl prov.: Genç, Bitlis prov.: Kermete, Mutki, Diyarbakır prov.: Centre, Çermik, Çüngüş, Silvan, Erzincan prov.: Centre, Üzümlü, İçel prov.: Tarsus, İzmir prov.: Bornova, Menemen,

Ödemiş, Malatya prov.: Centre, Hacırahmanlı, Manisa prov.: Saruhanlı, Uşak prov.: Van prov.: Beyüzümü, Erçiş, Zonguldak prov.: Ulus (Lodos & Kalkandelen, 1985b); Adana prov.: Balcalı, Hacıali, Şihmurat, Hatay prov.: Dört Yol, İskenderun, İçel prov.: Erdemli (Başpınar & Uygun, 1991c); Amasya prov., Ordu prov.: Çambaşı, Samsun prov.: Ayvacık, Kocadağ, Ladik (Zeybekoğlu, 1993, 1998); Antalya prov.: Aksu (Topallar), Finike (Erenkavak, Turunçova, Yeşilyurt), Kale (Eseler), Kemer (Böğürtlenözü, Karabucak), Korkuteli (Datköy), Serik (Camili) (Demir, 2006c).

Tribe: DELTOCEPHALINI

Genus: *Recilia* Edwards, 1922

Synonym: = *Inemadara* Ishihara, 1953

***Recilia schmidtgeni* (Wagner, 1939)**

Distribution: AL, AT, BG, CS, FR, DE, GR, HU, MD, RO, S-RU, SA, SC, SL, SN, SW, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 21, 24, 33, 35, 50, 55, 57, 60, 63, 71).

Adana prov.: Karataş, Kozan, Misis, Ankara prov.: Mogan Gölü as *Deltocephalus schmidtgeni* Wagner, 1939 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk, Çubuk Barajı, Eymir gölü, Lalahan (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Centre, Kırıkkale prov., Diyarbakır prov.: Centre, Erzincan prov.: Üzümlü, İzmir prov.: Narlıdere, Mordoğan, Nevşehir: Çat, Samsun: Centre, Urfa prov.: Ceylanpınar (Lodos & Kalkandelen, 1985c); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Adana prov.: Hacıali, Şihmurat, İçel prov.: Erdemli (Başpınar & Uygun, 1991c); Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Alanya (Konaklı, Okurcalar, Yeşilköy), Elmalı, Gazipaşa (Asarcık), Kale (Köşkerler), Kaş (İslamlar, Kalkan, Yeşilköy, Üzümlü), Kemer (Böğürtlenözü, Çamyuva, Karabucak), Kumluca (Kavakdibi), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Demirciler, Karaöz, Taşağıl, Sağrın), Serik (Sarıbalı) (Demir, 2006c).

Tribe: SCAPHYTOPIINI

Genus: *Stymphalus* Stal, 1866

***Stymphalus rubrolineatus* (Stal, 1855)**

Synonym: = *rubrostriatus* Horvath, 1907 = *rubrovittatus* Matsumura, 1914.

Distribution: AL, BG, CY, GR, IT, AR, EP, NE, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 21, 33, 34, 47).

Diyarbakır prov.: Silvan, İstanbul prov.: Doğan kent, Mardin prov. (Lodos & Kalkandelen, 1985c); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Adana prov.: Karataş, Şihmurat, İçel prov.: Erdemli, Alata as *Stymphalus rubrostriatus* Horvath, 1907 (Başpınar & Uygun, 1992a); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) as *Stymphalus rubrostriatus* Horvath, 1907 (Demir, 2006c).

Tribe: DORATURINI

Genus: *Chiasmus* Mulsant et Rey, 1855

Synonym: = *Atractotypus* Fieber, 1866

***Chiasmus conspurcatus* (Perris, 1857)**

Synonym: = *gautschii* Then, 1886 = *laboulbenii* Perris, 1857.

Distribution: AL, AT?, BG, CI, FR, GR, IT, PT, SA, SC, SN, ES, SW, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 05, 06, 07, 08, 18, 21, 42, 53, 57, 60, 63).

Adana prov.: Kozan, Ankara prov.: Mogan Gölü (Dlabola, 1957); Masure-Gazipaşa, Aspendos-Perge (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Anıttepe, Eymir gölü, Ankara-Elmadağ, Konya prov.: Ereğli, Meram (Kalkandelen, 1974); Artvin prov.: Borçka, Çankırı prov.: Çatalema, Diyarbakır prov.: Çüngüş, Rize prov.: Centre, Urfa prov.: Harran (Lodos & Kalkandelen, 1985c); Adana prov.: Şihmurat (Başpınar & Uygun, 1992a); Amasya prov., Sinop prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Alanya (Yeşilköy), Elmalı

(Gökpınar), Finike (Turunçova), Kemer (Çamyuva), Manavgat (Beşkonak, Centre) (Demir, 2006c).

Genus: *Doratūra* Sahlberg, 1871

***Doratūra heterophyla* Horvath, 1903**

Distribution: AT, BG, E-TR, GR, IT, MD, RO, UA, YU, EP, NE, TR. **Distribution in Turkey:** (01, 22).

Adana prov., Edirne prov. (Dlabola, 1957).

***Doratūra homophyla* (Flor, 1871)**

Distribution: AL, AT, BE, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IT, LA, LI, MD, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SE, NL, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 05, 07, 31, 06, 14, 21, 26, 27, 57, 65, 71).

Hatay prov.: Iskenderun (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Kozan, Ankara prov.: Beynam (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Lalahan (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Kızılcahamam, Polatlı, Kırıkkale, Bolu prov., Diyarbakır prov.: Centre, Eskişehir prov.: Alpu, Gaziantep prov.: Nurgana, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1985c); Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1992a); Amasya prov., Sinop prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Elmalı (Centre, Gökpınar, Tekkeköy), Güllükdağı, Korkuteli (Ulucak) (Demir, 2006c).

Genus: *Aconurella* Ribaut, 1948

***Aconurella prolixa* (Lethierry, 1885)**

Synonym: = *minutus* Haupt, 1917 = *obtusus* Metcalf, 1955 = *sanguisuga* Lindberg, 1927 = *simplex* Haupt, 1927.

Distribution: BG, CI, CO, CY, FR, GR, IT, ME, N-AE, PT, S-RU, SC, ES, YU, AR, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 51, 06, 07, 08, 24, 25, 27, 33, 46, 53, 68).

Adana prov.: Kozan, Ankara prov.: Beynam, Mogan Gölü (Dlabola, 1957); Aksaray prov. (Linnavuori, 1965); Esendere-Yüksekova, Silifke-Işıkli, Antalya-Bucak, Aspendos-Perge (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Centre, Kalecik, Artvin prov.: Centre, Ardanuç, Erzincan prov.: Centre, Erzurum prov.: Uuzndere, Gaziantep prov.: Türkoğlu, Maraş prov.: Afşin, Rize prov.: Centre (Lodos & Kalkandelen, 1985c); Adana prov.: Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992a); Nevşehir prov.: Ürgüp, İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Elmalı (Akçay, Centre), Kaş (Kalkan, Üzümlü), Korkuteli (Yazır-İmrahor, Ulucak), Manavgat (Bucakşeyhler, Belenobasi, Beşkonak, Centre, Çayyazı, Demirciler, Taşağıl) (Demir, 2006c).

Tribe: FIEBERIELLINI

Genus: *Fieberiella* Signoret, 1880

Synonym: = *Fieberia* Signoret, 1879

***Fieberiella aschei* Meyer-Arndt, 1988**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Beydağları, 10 km S Elmalı, Avlan Gölü, Kemer (Meyer-Arndt, 1988); Antalya prov.: Elmalı (Çığlıkara) Korkuteli 30 km W (Demir, 2006c).

***Fieberiella chioscola* Meyer-Arndt, 1988**

Distribution: N-AE, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Düzlerçamı (Demir, 2006c).

***Fieberiella gemelina* Dlabola, 1965**

Distribution: IQ, TR.

Distribution in Turkey: (01, 35).

İzmir prov. (Lodos & Kalkandelen, 1986); Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1992a).

***Fieberiella lindbergi* Wagner, 1963**

Distribution: CY, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Pozantı (Linnavuori, 1965).

***Fieberiella macchiae* Linnavuori, 1962**

Distribution: NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 20, 43, 48, 50, 67).

Adana prov.: Hasanbeyli, Antalya prov.: Centre, Gündoğmuş, Korkuteli, Kütahya prov.: Tavşanlı, Muğla prov.: Milas, Nevşehir prov.: Ürgüp, Zonguldak prov.: Karabük (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Denizli prov.: Honaz dağı (Dlabola, 1971a); Antalya prov.: Manavgat (Evrenleriyavşı, Söylerkale) (Demir, 2006c).

***Fieberiella oenderi* Dlabola, 1985**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07, 32).

Antalya prov.: Centre (Dlabola, 1985); Isparta prov.: Eğridir-Taşköy (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy, Murtiçi), Çığlık, Gündoğmuş (Çiçekoluk), İbradı (Üzümdere), Güllükdağı, Kemer, Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Demirciler, Külcüler) (Demir, 2006c).

***Fieberiella septentrionalis* Wagner, 1963**

Synonym: = *macchiae* auct.

Distribution: BG, CS, DE, GR, HU, PL, RO, S-RU, SL, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 08, 16, 43, 4, 54).

Ankara prov.: Baraj, Mollafeneri (Dlabola, 1965); Antalya prov.: Korkuteli, Artvin prov.: Seyitler, Bursa prov., Malatya prov., Sakarya prov.: Adapazarı, Karasu, Sarıgazi (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Ankara Baraj, Mollafeneri (Dlabola, 1965); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıklıdağı, Aköz, Salın, Soğuksu) (Demir, 2006b);

Genus: *Synophropsis* Haupt, 1926

***Synophropsis lauri* (Horvath, 1897)**

Synonym: = *wagneri* Haupt, 1926.

Distribution: CR, CA, CY, DO, FR, GR, HU, IT, N-AE, S-RU, SC, SN, SW, UA, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (05, 31, 06, 07, 33, 34, 53, 55, 57, 60, 61, 77).

Ankara prov.: Centre, İstanbul prov.: Kartal, Cevizli, Rize prov., Samsun prov.: Bafra, Sinop prov.: Aklıman, Trabzon prov.: Akçaabat, Centre (Lodos & Kalkandelen, 1986a); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Yalova prov. (Dlabola, 1971a); Amasya prov., Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Güllükdağı, Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).

Genus: *Docotettix* Ribaut, 1948

***Docotettix cornutus* Ribaut, 1948**

Distribution: CY, DO, N-AE, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07, 09, 35).

Antalya prov.: Termosos, Varsak, Aydın prov.: Çine, Kuşadası, İzmir prov.: Bayındır, Narhıdere, Pamucak (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), İbradı (Üzümdere), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik, Kalecik, Serinyaka), Güllükdağı, Kaş (Dirgenler), Korkuteli 30 km W, Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler, Beşkonak, Köprülü Kanyon, Külcüler, Evrenleriyavşı, Söylerkale, Yukarıuşklar-Tilkiler), Serik (Sarıbah) (Demir, 2006c).

Tribe: STIRELLINI**Genus: *Doratulina* Melichar, 1903**

Synonym: = *Pseudaconura* Linnavuori, 1952 = *Trebellius* Distant, 1918

***Doratulina acuticeps* (Ribaut, 1948)**

Distribution: CY, GR, NE, TR.

Distribution in Turkey: (31).

Hatay prov.: İskenderun as *Stirellus acuticeps* Rib. (Linnavuori, 1965).

***Doratulina instabilis* (Ribaut, 1948)**

Distribution: CY, GR, IT, AR, NE N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (31, 06, 42, 56).

Hatay prov.: Yayladağı-Belen as *Stirellus instabilis* Rib. (Linnavuori, 1965); Konya prov.: Ereğli (Kartal, 1981); Ankara prov.: Çubuk Barajı II, Konya prov.: Ereğli, Siirt prov.: Şirvan (Lodos & Kalkandelen, 1986a).

***Doratulina pallifrons* (Horvath, 1897)**

Synonym: = *margaritacea* Horvath, 1897.

Distribution: CY?, GR, IE, RO, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).

Genus: *Exitianus* Ball, 1929

Synonym: = *Mimodrylix* Zachvatkin, 1935

***Exitianus capicola* (Stal, 1855)**

Synonym: = *albipennis* Haupt, 1927 = *ragusai* Haupt, 1924 = *taeniaceps* Kirschbaum, 1868. **Distribution:** AL, CI, CY, FR, GR, HU?, IT?, ME, PT, SA?, SC, ES, AR, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 33, 35, 48).

Adana prov.: Kozan, Ağapınarı, Gavur Dağı, Karataş as *Exitianus taeniaceps* Kirschbaum, 1868 (Dlabola, 1957); Adana prov.: Centre, Ceyhan, Misis, Pozanti, Antalya prov.: Aksu, Güllöyük, İçel prov.: Tarsus, İzmir prov.: Narlıdere, Ödemiş-Bozdağ, Muğla prov.: Dalaman (Lodos & Kalkandelen, 1986a); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); East mediterranean region (Başpınar & Uygun, 1992a); Antalya prov.: Alanya (Keşefli, Kargıcak, Okurcalar, Obaköy), Finike (Turunçova, Yeşilyurt), Gazipaşa (Asarcık, Çalıpınar, Macarköy), Kale (Eseler), Kaş (Kalkan, Yeşilköy), Kemer (Böğürtlenözü, Çamyuva), Kumluca (Kavakköy), Manavgat (Bucakşeyhler, Belenobası, Beşkonak, Değirmenli, Demirciler, Çayyazı, Centre, Ilıca, Çakış, Hacıobası, Karaöz, Seleukeia, Taşağıl), Serik (Dikmen) (Demir, 2006c).

***Exitianus fasciolatus* (Melichar, 1911)**

Synonym: = *unifasciatus* Haupt, 1930 = *vulnerans* Bergevin, 1925.

Distribution: CI, IT, ME, SC, AR, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 13, 21, 27, 35, 42, 46, 47, 50, 51, 54, 63).

Adana prov.: Kozan *Exitianus vulnerans* Bergevin, 1925 (Dlabola, 1957); Fevzipaşa-Mersin (Dlabola, 1971b); Bitlis prov.: Hizan, Diyarbakır prov.: Centre, Silvan, Gaziantep prov.: Nurgana, İzmir prov.: Çeşme, Konya prov.: Karaman prov., Maraş prov.: Andırın, Mardin prov.: Cizre, Nevşehir prov.: Avanos, Niğde prov., Sakarya prov.: Hendek, Urfa prov.: Ceylanpınar, Harran (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1992a); Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Gündoğmuş (Çiçekoluk), Manavgat (Demirciler, Yukarıuşıklar-Tilkiler, Tilkiler, Yaylaalan) (Demir, 2006c).

Tribe: TETARTOSTYLINI**Genus: *Tetartostylus* Wagner, 1951*****Tetartostylus illyricus* (Kirschbaum 1868)**

Synonym: = *pellucidus* Wagner, 1951.

Distribution: AL, AT, CA, GR, HU, IT?, RO, SL, SN, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 22, 34).

Ankara prov.: Çubuk Barajı as *Tetartostylus pellucidus* Melichar, 1896 (Kalkandelen, 1974); Edirne prov., İstanbul prov.: Kartal-Cevizli as *Tetartostylus pellucidus* Wagner, 1951 (Lodos & Kalkandelen, 1986a); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler) (Demir, 2006c).

Tribe: ATHYSANINI

Genus: *Laminacutus* Abdul-Nour, 2001

***Laminacutus libanensis* Abdul-Nour, 2001**

Distribution: LB, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Kemer (Çamyuva), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Genus: *Platymetopius* Burmeister, 1838

Synonym: = *Eremetopius* Lindberg, 1927 = *Mahalana* Distant, 1918

***Platymetopius cruentatus* Haupt, 1927**

Distribution: IR, IQ, IL, JO, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 48, 50).

Adana: Bürücek, Centre, Abacılar (Dlabola, 1957); Ankara prov. (Kalkandelen, 1974); Ankara prov., Muğla prov., Nevşehir prov. (Lodos & Kalkandelen, 1986b); Adana prov.: Balcah (Başpınar & Uygun, 1992a).

***Platymetopius enatus* Dlabola, 1974**

Distribution: IR, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Güllükdağı (Demir, 2006c).

***Platymetopius (s. str.) filigranus* (Scott, 1876)**

Distribution: AT?, BE?, BG, CS, FR, GR, HU, IT, SC, SL, ES?, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 22).

Ankara prov.: Baraj, Adana prov.: Suluhan, Edirne prov. (Dlabola, 1957).

***Platymetopius (s. str.) guttatus* Fieber, 1869**

Distribution: AL, AT, BE?, BG, CY, CS, FR, DE, GR?, HU, IT, MD, NO, PL, PT, S-RU, SE, NL?, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 05, 07, 16, 35, 43, 52, 55, 57, 60, 61).

Adana prov.: Mollafeneri, Kayalıdağ (Dlabola, 1957); Bursa prov.: İnegöl, İzmir prov.: Bayındır (Lodos & Kalkandelen, 1986b); Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Amasya prov., Ordu prov., Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov., Trabzon prov. (Zeybekoğlu, 1998); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

***Platymetopius (s. str.) henribauti* Dlabola, 1961**

Distribution: BG, CS, DE?, GR, IT, S-RU, SL, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 10, 42, 43, 58).

Ankara prov.: Çubuk Barajı, Karagöl, Lalahan (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Çamlıdere, Konya prov.: Hanönü beli (Lodos & Kalkandelen, 1986b); Sivas prov.: Gürün, Kandilli, Kütahya prov.: 30 km S Kütahya (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler, Demirciler) (Demir, 2006c).

***Platymetopius (s. str.) undatus* (De Geer, 1773)**

Synonym: = *flammigera* Villers, 1789.

Distribution: AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SC?, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (06, 41, 01).

Ankara prov. (Dlabola, 1957); İzmit prov. (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Hasanbeyli (Lodos & Kalkandelen, 1986b).

***Platymetopius (Quernus) curvatus* Dlabola, 1974**

Distribution: FR, YU, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06).

Adana prov.: Hasanbeyli, Ankara prov.: Beynam (Lodos & Kalkandelen, 1986b).

***Platymetopius quercinus* Dlabola, 1974**

Distribution: IR, TR.

Distribution in Turkey: (02, 07, 40, 47).

Adıyaman prov., Kırşehir prov.: Yılandağı, Mardin prov.: Midyat, Sultan Şehmuz, (Lodos & Kalkandelen, 1986b); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi) (Demir, 2006c).

***Platymetopius (s. str.) obsoletus* (Signoret, 1880)**

Distribution: FR, IT, S-RU, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Saklıkent (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Proceps* Mulsant et Rey, 1855***Proceps acicularis* Mulsant et Rey, 1855**

Synonym: = *albolimbatus* Kirschbaum, 1868.

Distribution: BG, CY, FR, GR, IT, RO, S-RU, SA, SC, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07).

Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1957); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva), Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

Genus: *Grammacephalus* Haupt, 1929***Grammacephalus pugio* (Noualhier, 1895)**

Distribution: IR, IL, EG, SY, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1992a).

Genus: *Anoplotettix* Ribaut, 1942***Anoplotettix eckerleini* Dlabola, 1965**

Distribution: LB, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Gündoğmuş (Lodos & Kalkandelen, 1986b); Antalya prov.: Gündoğmuş (Güneycik), Manavgat (Beşkonak, Köprülü Kanyon, Demirciler) (Demir, 2006c).

***Anoplotettix kalkandeleni* Dlabola, 1971**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Alanya (Dlabola, 1971a); Antalya prov.: Gündoğmuş (Güneycik) (Demir, 2006c).

***Anoplotettix novaki* Wagner, 1959**

Distribution: CA, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov. (Kartal, 1981).

***Anoplotettix rodosicus* Dlabola, 1974**

Distribution: DO, TR.

Distribution in Turkey: (07, 48).

Antalya prov.: Doyran, Varsak, Muğla prov.: Köyceğiz (Lodos & Kalkandelen, 1986b);
Antalya prov.: Gazıpaşa (Çalıpınar, Çalıpınar-Kahyalar), Güllükdağı (Demir, 2006c).

Genus: *Paramesodes* Ishihara, 1953

Synonym: = *Coexitianus* Dlabola, 1960

***Paramesodes lineaticollis* (Distant, 1908)**

Distribution: OR, S-IT, IL, UZ, RU, TR, IR.

Distribution in Turkey: (33).

İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981).

Genus: *Osbornellus* Ball, 1932

***Osbornellus (Mavromoustacus) macchiai* (Lindberg 1948)**

Synonym: = *consanguineus* Dlabola, 1967.

Distribution: CY, GR, TR.

Distribution in Turkey: (05, 33).

İçel prov.: Kadıncık Barajı (Kartal, 1981); Amasya prov. (Zeybekoğlu, 1998).

Genus: *Allygus* Fieber, 1875

***Allygus mixtus* (Fabricius, 1794)**

Synonym: = *alticola* Horvath, 1903 = *corispennis* Ferrari, 1882.

Distribution: AT, BE, BT, BG, CA, CS, DK, EE?, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA?, LI?, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 42).

Ankara prov.: Kızılcahamam, Adana prov.: Pozantı (Kartal, 1981); Konya prov.: Deştığın (Lodos & Kalkandelen, 1986c); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Yukarıçanlı) (Demir, 2006b).

Genus: *Phlepsius* Fieber, 1866

***Phlepsius intricatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Synonym: = *octopunctatus* Burmeister, 1838.

Distribution: AL, AT, BI, BG, CS, TR, FR, DE, GR, HU, IT, MD, PT, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, NE, N-AC.

Distribution in Turkey: (14, 05, 06, 07, 17, 21, 32, 35, 36, 40, 44, 47, 48, 50, 55, 61, 74).

Bartın prov.: Akçakoca (Linnavuori, 1965); Isparta prov. (Kalkandelen, 1974); Amasya prov., Çanakkale prov., Diyarbakır prov.: Centre, Nusaybin, Silvan, Isparta prov., İzmir prov., Kars prov.: Gazılar, Kırşehir prov.: Hirfanlı, Malatya prov.: Hasırcılar, Mardin prov.: Silopi, Muğla prov.: Fethiye, Nevşehir prov.: Gülşehir (Lodos & Kalkandelen, 1986c); Amasya prov., Samsun prov., Trabzon prov. (Zeybekoğlu, 1998); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Salin) (Demir, 2006b); Antalya: Elmalı (Akçay), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Çayyazı, Demirciler) (Demir, 2006c).

***Phlepsius ornatus* (Perris, 1857)**

Distribution: AF, DZ, FR, DE, IR, IL, LY, RO, ES, TR, KG, KK, TM, UA.

Distribution in Turkey: (01, 05, 06, 21, 33, 42, 50, 52, 55, 57, 60, 61).

Ankara prov.: Centre, Diyarbakır prov.: Centre, Konya prov.: Yunak, Nevşehir prov.: Avanos (Lodos & Kalkandelen, 1986c); Adana prov.: Balcalı, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Amasya prov., Ordu prov., Samsun prov., Sinop prov., Tokat prov., Trabzon prov. (Zeybekoğlu, 1998).

Genus: *Selenocephalus* Germar, 1833

Synonym: = *Levantotettix* Lindberg, 1953

Selenocephalus ankarae* Dlabola, 1957*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (05, 06, 07, 48, 60).

Ankara prov.: Baraj (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Karagöl, Lalahan (Kalkandelen, 1974); Antalya prov.: Akseki, Saklıkent, Söğüt, Muğla prov.: Marmaris, Milas (Lodos & Kalkandelen, 1986c); Amasya prov., Tokat prov. (Zeybekoğlu, 1998, 2000); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), Güllükdağı, İbradı-Akşahap, Kumluca (Saricasu), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Selenocephalus obsoletus* (Germar, 1817)*Synonym:** = *griseus* Fabricius, 1794.**Distribution:** AL, AT, BG, SL, FR, HU, IR, IT, SA, SC, MA, RO, ES, TN, TR, AZ, MD, UA, YU.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 22, 34, 41, 05, 52, 53, 55, 60, 61).

İstanbul prov.: Polenezköy as *Selenocephalus griseus* F. (Fahringer, 1922); Adana prov.: Bürücek, Karataş, Ankara prov.: Baraj, Beynam, Edirne (Dlabola, 1957); İzmit prov. *Selenocephalus griseus* Fab. (Linnavuori, 1965); Amasya prov., Giresun prov., Ordu prov., Rize prov., Samsun prov., Tokat prov., Trabzon prov. (Zeybekoğlu, 2000).

Selenocephalus pallidus* Kirschbaum, 1868*Distribution:** AL, AT?, BG, GR, HU, IT, S-RU, UA, YU, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 55, 57, 60, 66).

Adana prov.: Karataş, Gavur Dağı, Tapan, Ankara prov.: Beynam, Baraj (Dlabola, 1957); Gülek, Ankara prov.: Kızılcahamam (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Lalahan, Eymir gölü, Çanakkale prov. (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Hasanbeyli, Ankara prov.: Çubuk, Eymir, Lalahan, Kalecik, Kurtboğazi, Nallıhan, Antalya prov.: Alanya, Manavgat, Aydın prov.: Kuşadası, Bolu prov., Burdur prov.: Gülhisar, Bursa prov.: Centre-Doğanköy, Çanakkale prov., Çankırı prov.: Kurşunlu, Çorum prov.: Centre, Bayat, Denizli prov.: Tavas, Isparta prov.: Eğridir, İzmir prov.: Karaburun, Ödemiş-Samsundığı, Menemen, Kayseri prov.: Hacılar, Kırşehir prov.: Yılandağı, Konya prov.: Ermenek, Seydişehir, Manisa prov.: Gördes, Sinop prov.: Gerze, Tokat prov.: Erbaa, Yozgat prov.: Çekerek (Lodos & Kalkandelen, 1986c); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Ankara prov.: Sincan Müllü (Demir, 2007b), Antalya prov.: Akseki (Murtiçi), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik, Kalecik), Hisarçandır, İbradı (Ormana), Kaş (Kemerköy), Kemer (Olympos National Park), Kumluca (Altınyaka-Karacağaç), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Demirciler), Serik (Sarıabahi) (Demir, 2006c).

Selenocephalus sirvadi* Dlabola, 1965*Distribution:** JO, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 04, 13, 27, 63, 65).

Adana prov.: Yumurtaalık, Ağrı prov.: Tutak-Patnos, Bitlis prov., Gaziantep prov.: Centre, İslahiye, Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1986c).

Selenocephalus tapan* Dlabola, 1981*Distribution:** TR.**Distribution in Turkey:** (01).

Adana prov.: Tapan, Gavur dağ (Dlabola, 1981).

Genus: *Hardya* Edwards, 1922***Hardya anatolica* Zachvatkin, 1946****Distribution:** BG, GR, IT, RO, YU, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 14, 02, 07, 10, 23, 24, 32, 35, 38, 40, 44, 70, 50, 52).

Bolu prov.: Gerede (Linnavuori, 1965); Kayseri prov.: Erciyes Dağı (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Çubuk Barajı, Çubuk, Ankara-Elmadağ, Lalahan, Eymir gölü, Beynam, Anıttepe, Atatürk Orman Çiftliği, Nevşehir prov.: Ürgüp (Kalkandelen, 1974); Adıyaman prov.: Nemrut dağı, Ankara prov.: Centre, Beynam, Çamlidere, Kazan, Kızılcahamam,

Şereflikoçhisar, Antalya prov.: Söğüt, Bolu prov.: Kıbrısçık, Seben, Elazığ prov.: Düzönü, Sivrice, Erzincan prov.: Centre, Refahiye, Isparta prov., İzmir prov.: Menemen, Kayseri prov.: Erciyes, Kırşehir prov.: Centre, Kaman, Karaman prov., Nevşehir: prov. Boyalı, Gülşehir, Ürgüp, Yüksekli, Ordu prov.: Mesudiye (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Nevşehir prov.: Ürgüp, Malatya prov.: Balaban, Karahan Pass, Nurhak dağ, Kandilli (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Belpınar, Eyrekkaya, Keçikaya-Işıkdığı, Sey Hamamı, Yenimahalle, Aköz, Salin, Yasin, Yukarıçanlı, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy, Akyurt, İdrisdağı), Ayaş (Akyatak, Yenikent), Kızılcahamam (Soğuksu), Çamlıdere (Demir, 2007b); Antalya prov.: Korkuteli (Korudağı, Kartal Yaylası) (Demir, 2006c).

Genus: *Eohardya* Zachvatkin, 1946

***Eohardya fraudulentus* (Horvath, 1903)**

Synonym: = *byzantina* Zachvatkin, 1946 = *imitatus* Haupt, 1924 = *insularis* Lindberg, 1948 = *mira* Zachvatkin, 1946.

Distribution: AL, BG, CY, FR, GR, HU, IT, RO, S-RU, SA, SC, SL, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07).

Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Yukarı Kışla Köyü, Eymir gölü (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Eymir gölü (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Işıkdığı, Aköz, Salin) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Güllükdağı, Kemer (Çamyuva), Manavgat (Bucakşeyhler, Seleukeia) (Demir, 2006c).

Genus: *Cicadula* Zetterstedt, 1840

***Cicadula (Henriana) lineatopunctata* (Matsumura, 1908)**

Synonym: = *divaricata* Ribaut, 1952 = *siciliensis* Matsumura, 1908.

Distribution: BG, FR, GR, IT, PT, SA, SC, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 09, 10, 14, 81, 16, 18, 21, 24, 35, 44, 47, 54, 57, 63).

Adana prov.: Gavur Dağı, Kozan as *Cicadula divaricata* v. *pallidifrons* Ribaut, 1952 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Kayaş, Eymir, Atatürk Orman Çiftliği, Kızılcahamam as *Cicadula divaricata* Ribaut, 1952 (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Çubuk, Nallıhan, Kızılcahamam, Aydın prov.: Germencik, Bolu prov.: Abant, Seben, Düzce prov., Bursa prov.: Centre, İnegöl, Çankırı prov.: Çatalema, Karaömer, Konak, İnandık, Diyarbakır prov.: Centre, Silvan, Erzincan prov.: Centre, İzmir prov.: Ödemiş, Mardin prov.: Cizre, Mazı dağı, Sakarya prov.: Adapazarı, Hendek, Sinop prov.: Boyabat, Urfa prov.: Birecik, Siverek as *Cicadula divaricata* Ribaut, 1952 (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Sapanca gölü, Malatya prov.: Darende, Balaban as *Cicadula divaricata* Ribaut, 1952 (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva) (Demir, 2006c).

Genus: *Mocydiopsis* Ribaut, 1939

***Mocydiopsis monticola* Remane, 1961**

Distribution: AT, FR, GR, HU, S-RU, ES, YU, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 21, 33, 55, 64).

Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Diyarbakır prov.: Centre, Samsun prov.: Centre, Havza, Ladik, Uşak prov.: Centre (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Adana prov.: Gavur dağ (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy), Manavgat (Beşkonak, Demirciler, Taşağıl) (Demir, 2006c).

Genus: *Thamnotettix* Zetterstedt, 1840

Synonym: = *Thamnus* Fieber, 1866

***Thamnotettix (s. str.) creticus* Dlabola, 1974**

Distribution: CR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 05, 07, 31, 33, 55, 57, 60, 80).

Adana prov.: Gülek, İçel prov.: Viranşehir, Cemilli, Kuzucubelen, Çamlıyayla, Kadıncık (Kartal, 1983); Osmaniye prov.: Zorkun, Hatay prov.: İskenderun, Belen, Kömür Çukuru, İçel prov.: Silifke, Sinop prov.: Mertoğlu (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy, Geriş), Gündoğmuş (Güneycik, Serinyaka), İbradı (Başlar), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Thamnotettix (Loepotettix) exemptus Melichar, 1896

Distribution: AL, AT, BG, CS, FR, GR, HU, IT, MD, RO, SN, YU, TR.

Distribution in Turkey: (31, 37, 80).

Osmaniye prov.: Zorkun (Kartal, 1983); Hatay prov.: İskenderun, Kastamonu prov.: Küre (Lodos & Kalkandelen, 1987a).

Thamnotettix klapperichi Dlabola, 1965

Distribution: SY, JO, TR.

Distribution in Turkey: (07, 31).

Hatay prov.: Nur dağı, Antalya prov.: Alanya (Dlabola, 1971).

Thamnotettix vittmeri Dlabola, 1971

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (07, 48, 35).

Muğla prov.: Yatağan, İzmir prov.: Efes, Ayolin (Dlabola, 1971a); Antalya prov.: Gündoğmuş (Güneycik), Manavgat (Bucakşeyhler, Seleukeia, Demirciler) (Demir, 2006c).

Thamnotettix (s. str.) zelleri (Kirschbaum, 1868)

Distribution: CY, FR, GR, IT, SA, SC, SN, YU, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 09, 16, 17, 19, 22, 31, 33, 35, 39, 45, 48, 59, 71).

Adana prov.: Centre, Antalya prov.: Centre, Seki, Side, Aydın prov.: Sultanhisar, Bursa prov.: Mustafakemalpaşa, Çanakkale prov.: Biga, Çorum prov.: Dodurga, Edirne prov.: Havsa, Hatay prov.: Yayladağ, İzmir prov.: Bornova, Bayındır, İnciraltı, Narlıdere, Dikili, Balıkhova, Çeşme, Kemalpaşa, Kırklareli prov.: Lüleburgaz, Manisa prov.: Akhisar, Gölarmara, Salihli, Muğla prov.: Bodrum, Tekirdağ prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987a); Adana prov.: Balcalı, Şihmurat, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Antalya prov.: Akseki (Geriş-Cemerler), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik), Kemer (Çamyuva), Manavgat (Demirciler, Hocalı, Külçüler, Belenobası, Saraçlı, Yaylaalan, Tilkiler, Yukarışıklar-Tilkiler, Beşkonak, Bucakşeyhler, Seleukeia) (Demir, 2006c).

Genus: *Handianus* Ribaut, 1942

Handianus procerus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Distribution: AT, BG, CS, TR, FR, GR, HU, MD, PL, PT, RO, S-RU, SL, UA, YU, EP, NE.

Distribution in Turkey: (04, 03, 71, 06, 07, 10, 13, 14, 22, 25, 32, 35, 42, 44, 50, 51, 63, 65, 67).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam, Edirne (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Lalahan, Eymir gölü (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Tendürek dağı, Afyon prov.: Çay, Ankara prov.: Keskin, Antalya prov., Bitlis prov., Erzurum prov., Isparta prov.: Centre, Eğirdir, İzmir prov.: Bozdağ, Konya prov.: Hadim, Seydişehir, Malatya prov.: Tahir dağı, Nevşehir prov.: Boyalı, Niğde prov., Urfa prov.: Harran, Van prov.: Başkale, Zoguldak prov.: Safranbolu (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Bolu prov.: Gerde, Bolu dağları, Nevşehir prov.: Ürgüp, Kandilli (Dlabola, 1981); Balıkesir prov.: Kazdağı (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Belpınar, Sey Hamamı, Yenimahalle, Salin, Yasin) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt), Kızılcahamam (Soğuksu) (Demir, 2007b).

Genus: *Limotettix* Sahlberg, 1871

Synonym: = *Drylix* Edwards, 1922

Limotettix striola (Fallen, 1806)

Synonym: = *frenatus* Germar, 1821.

Distribution: AL, AT, AO, BE, BT, BG, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, Tr.

Distribution in Turkey: (04, 06, 07, 08, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 76, 44, 46, 50, 51, 54, 63, 65, 67, 81).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam, Adana prov.: Kızılıran (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Ankara-Elmadağ, Hasanoğlan, Mogan Gölü, Eymir gölü, Atatürk Orman Çiftliği, Nevşehir prov.: Çat, Boyalı (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Patnos, Ankara prov.: Kazan, Artvin prov.: Murgul, Düzce prov., Bursa prov.: İnegöl, Çankırı prov.: Karacahasan, Karaömer, Ilgaz, Diyarbakır prov.: Centre, Erzincan prov.: Ilıç, Refahiye, Erzurum prov.: Tortum, Tufanç, İstanbul prov.: Kartal, Iğdır prov., Maraş prov.: Göksun, Niğde prov.: Centre, Çiftahan, Sakarya prov.: Hendek, Urfa prov.: Hilvan, Van prov.: Başkale, Gevaş, Zoguldak prov.: Ulus (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Ankara prov.: Mogan gölü, Malatya prov.: Darende, Balaban, Karahan Pass (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Geriş), Kaş (İslamlar), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Genus: *Laburrus* Ribaut, 1942

***Laburrus (s. str.) impictifrons* (Boheman, 1852)**

Synonym: = *anomalus* Uhler, 1896 = *sulphureus* Kirschbaum, 1858 = *thiogaster* Kirschbaum, 1858 = *vittatipes* Uhler, 1896.

Distribution: AT, BG, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, PL, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SN, ES, SE, UA, YU, EP, TR.

Distribution in Turkey: (46).

Maraş prov. (Lodos & Kalkandelen, 1988).

Genus: *Euscelidius* Ribaut, 1942

***Euscelidius mundus* (Haupt, 1927)**

Synonym: = *orientalis* Dlabola, 1957.

Distribution: GR, UA, EP, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 31, 33, 32, 21, 25, 27, 35, 47, 63, 65).

Hatay prov.: İskenderun (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Isparta prov.: Yakiören (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Centre, Diyarbakır prov.: Centre, Erzurum prov.: Centre, İspir, Gaziantep prov.: Nurgana, İzmir prov.: Karaburun, Narlıdere, Ödemiş, Mardin prov.: Cizre, Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Başkale, Çatak (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Antalya prov.: Kemer (Çamyuva, Karabucak), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

***Euscelidius schenckii* (Kirschbaum, 1868)**

Synonym: = *zetterstedti* Melichar, 1896.

Distribution: AT, BE, BT?, BG, CI, CY, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, LA, LI, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SC, SL, SE, UA, YU, EP, NE, NA, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 16, 21, 33, 35, 56).

Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Ankara prov.: Etimesgut (Kalkandelen, 1974); Bursa prov.: Karacabey, Diyarbakır prov.: Centre, İçel prov.: Tarsus, İzmir: Bayındır, Siirt prov.: Kozluk (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Antalya prov.: Manavgat (Demirciler) (Demir, 2006c).

***Euscelidius variegatus* (Kirschbaum, 1858)**

Synonym: = *doderi* Ferrari, 1888 = *duplex* Rey, 1894 = *irroratus* Scott, 1875 = *maculosus* Rey, 1891.

Distribution: AT, AO, BI, BE, BT, BG, CI, CS, FR, DE, IT, MD, PL, PT, SA, SC, ES, SW, NL, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (07, 16, 34).

Bursa prov.: İnegöl, İstanbul prov.: Erenköy (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Antalya prov.: Manavgat (Evrerlyavaş, Söylerkale) (Demir, 2006c).

Genus: *Conosanus* Osborn & Ball, 1902Synonym: = *Metathysanus* Dahl, 1912***Conosanus obsoletus* (Kirschbaum, 1858)****Synonym:** = *covexus* Kirschbaum, 1868 = *piceus* Scott, 1875 = *sejugendus* Kirschbaum, 1868 = *sexpunctatus* Sahlberg, 1871.**Distribution:** AL, AT, AO, BE, BT, BG, CY, CS, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, PT, RO, SC, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 35, 09, 10, 14, 81, 40, 51).Adana prov.: Balcalı (Başpınar & Uygun, 1992b); Ankara prov.: Beynam, Mogan Gölü, Adana prov.: Bürücek as *Euscelis obsoletus* Kirschbaum, 1868 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk, Ankara-Elmadağ, Hasanoğlan, Eymir gölü as *Euscelis obsoletus* Kirschbaum, 1858 (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Soğanlı, Aydın prov.: Söke, Balıkesir prov.: Gönen, Bolu: Seben, Düzce prov.: İzmir prov.: Samsun dağı, Kırşehir prov.: Hirfanlı, Kaman, Niğde prov.: Çamardı (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Sey Hamamı, Aköz, Salin, Soğuksu) (Demir, 2006b).**Genus: *Euscelis* Brulle, 1832**Synonym: = *Phrynomorphus* Curtis, 1833***Euscelis alsoides* Remane, 1967****Distribution:** IR, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Manavgat (Demirciler, Yukarışıklar, Tilkiler) (Demir, 2006c).

Euscelis alsius* Ribaut, 1952*Distribution:** BG, GR, IT, PT, SC, ES, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 14, 33, 50, 51, 65).

Adana prov.: Gülek, Niğde prov.: Ulukışla (Linnavuori, 1965); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Atatürk Orman Çiftliği, Etimesgut, Ankara-Elmadağ, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ, Eymir gölü, Anıttepe (Kalkandelen, 1974); Sapanca gölü, Bolu prov.: Gerede, Bolu dağları, Nevşehir prov.: Ürgüp, Van: 16 km N Başkale, İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Ovacık (Dlabola, 1971a); Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Antalya prov.: Alanya (Keşefli, Okurcalar, Yeşilköy), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik, Serinyaka), Gazipaşa (Çalıpınar, Çalıpınar-Kahyalar), Güllükdağı, Korkuteli (Söğütçük, Yazır-İmrahor), Manavgat (Bucakşeyhler, Beşkonak, Demirciler, Yukarışıklar-Tilkiler, Taşağıl, Kilimli) (Demir, 2006c).

Euscelis incisus* (Kirschbaum, 1858)*Distribution:** AL, AT, BE, BT, BG, CY, CS, DK, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, ME, MD, PL, PT, RO, M-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, ES, SE, SW, UA, YU, EP, NE, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 06, 07, 38, 15, 22, 32, 33, 34, 26, 38, 41).İstanbul prov.: Pendik as *Athysanus plebejus* Fall. (Fahringer, 1922); Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel prov.: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Beynam, Adana prov.: Kozan, Misis, Edirne prov. *Euscelis plebejus* Fallen, 1806 (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Karagöl, Çubuk Barajı, Çubuk, Ankara-Elmadağ, Kayaş, Lalahan, Hasanoğlan, Eymir gölü, Kayseri prov.: Pınarbaşı, Develi, Mayla-Bünyan, Burdur prov.: Karagent, Isparta prov.: İğdecik, Eskişehir prov.: Biçer, Kocaeli as *Euscelis plebejus* Fallen, 1806 and Ankara prov.: Lalahan, Kayseri prov.: Pınarbaşı, Talas, Develi, Yahyalı, Isparta prov.: İğdecik as *Euscelis plebejus* var. *vernalis* Müller, 1954 (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Sey Hamamı, Yehimahalle, Aköz, Salin, Yukarıçanlı, Yasin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Gölköy), Ayaş (Akyatak, Yenikent) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler, Çayyazı) (Demir, 2006c).

***Euscelis lineolatus* Brulle, 1832**

Synonym: = *bilobatus* Wagner, 1952 = *bilunaris* Rey, 1891 = *nitidus* Curtis, 1833 = *ochrosomus* Kirschbaum, 1868 = *stictopterus* Flor, 1861.

Distribution: AL, AT?, BT, BG, CI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, PT, RO, SA, SC, SN, ES, SW?, NL, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (06, 07, 35, 71, 08, 10, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 51, 55, 61, 64).

Ankara prov.: Kalecik, Keskin, Şereflikoçhisar, Tuz gölü, Kırıkkale prov., Artvin prov.: Centre, Balıkesir prov.: Savaştepe, İzmir prov.: Bornova, Cumaovası, Mordoğan, Kırklareli prov.: Centre, Kırşehir: Centre, Konya prov.: Bozkır, Ereğli, Ermenek, Yunak, Malatya prov.: Centre, Manisa prov.: Demirci, Niğde prov.: Bor, Çiftahan, Ortaköy, Ulukışla, Trabzon prov.: Akçaabat, Uşak prov.: Banaz (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Antalya prov.: Akseki (Geriş), Alanya (Okurcalar), Manavgat (Belenobası, Demirciler, Hocalı, Yukarışıklar-Tilkiler, Yaylaalan) (Demir, 2006c).

Genus: *Streptanus* Ribaut, 1942***Streptanus albanicus* (Horváth 1916)**

Synonym: = *josifovi* Dlabola, 1957.

Distribution: BG, CY, GR, IT, SC, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 26, 33, 35, 38, 42, 43, 45).

Ankara prov.: Lalahan, Kayseri prov.: Yeşilhisar as *Streptanus josifovi* Dlabola, 1957 (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Ceyhan, Karaisalı, Yumurtalık, Eskişehir prov.: Sivrihisar, İçel prov.: Gözne, Namrun, Tarsus, İzmir prov.: Bozdağ, Konya prov.: Beyşehir, Kütahya prov.: Centre, Manisa prov.: Centre as *Streptanus josifovi* Dlabola, 1957 (Lodos & Kalkandelen, 1987b).

Genus: *Artianus* Ribaut, 1942***Artianus manderstjernii* (Kirschbaum, 1868)**

Distribution: AL, AT, BG, CS, E-TR, FR, GR, HU, IT, MD, RO, S-RU, SC, SL, UA, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (04, 06, 07, 10, 18, 21, 22, 27, 35, 39, 63, 65, 67).

Ankara prov.: Baraj, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Kayaş, Lalahan, Eymir gölü, Atatürk Orman Çiftliği (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Ağrı dağı, Ankara prov.: Çamlıdere, Kızılcahamam, Polatlı, Balıkesir prov.: İvrindi, Çankırı prov.: Çerkeş, Diyarbakır prov.: Centre, Gaziantep prov.: Nurgana, İzmir prov.: Bozdağ, Kırklareli prov.: Vize, Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Van gölü, Zonguldak prov.: Safranbolu (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Aköz, Belpınar, Sey Hamamı, Yenimahalle, Akz, Salin, Yukarıçanlı, Yasin, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt), Kızılcahamam (Soğuksu), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Elmalı (Centre, Çıglıkara, Gökpınar), Gündoğmuş (Çiçekoluk), Güllükdağı, Korkutelı (Beğiş-Karabayır, Korudağı, Kartal Yaylası, Söğütçük) (Demir, 2006c).

Genus: *Zercanus****Zercanus rubroocellatus* Dlabola, 1965**

Distribution: JO, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07).

Adana prov.: Hasanbeyli, Pozantı (Lodos & Kalkandelen, 1987b); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Tribe: PARALIMNINI**Genus: *Paramesus* Fieber, 1866**

Paramesus major* Haupt, 1927*Distribution:** AT, BG, CS, DE?, GR, HU, PL, S-RU, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 18, 21, 46, 56).Ankara prov.: Eymir as *Paramesus nervosus* Fallen, 1826 (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Eymir gölü, Mogan gölü, Çankırı prov.: Hacıhasan, Ilgaz, Diyarbakır prov.: Centre, Çınar, Maraş prov., Siirt prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987c).**Genus: *Paralimnus* Fieber, 1866*****Paralimnus phragmitis* (Boheman, 1847)****Synonym:** = *lugens* Horvath, 1897.**Distribution:** AT, BT, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA?, MD, NO, PL, RO, N-RU, S-RU, SC, SL, SN, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Manavgat (Demir, 2006c).

Genus: *Paralimnellus****Paralimnellus cingulatus* (Dlabola, 1960)****Distribution:** IQ, IR, UZ, TJ, TR.**Distribution in Turkey:** (07).

Antalya prov.: Manavgat (Örenşehir) (Demir, 2006c).

Genus: *Arocephalus* Ribaut, 1946***Arocephalus (s. str.) languidus* (Flor, 1861)****Synonym:** = *haupti* Lindberg, 1924 = *ocellatus* Cerutti, 1939 = *pallipes* Kirschbaum, 1868 = *productus* Thomson, 1869 = *pusillus* Kirschbaum, 1868.**Distribution:** AT, BE, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, MD, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SN, SE, SW, UA, YU, EP, NE, TR.**Distribution in Turkey:** (06, 07, 36).

Ankara prov.: Çubuk, Kars prov.: Sarıkamış (Lodos & Kalkandelen, 1987c); Antalya prov.: Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

Genus: *Psammotettix* Haupt, 1929**Synonym:** = *Ribautiellus* Zachvatkin, 1933***Psammotettix alienus* (Dahlbom, 1850)****Synonym:** = *breviceps* Kirschbaum, 1868 = *flavidus* Fieber, 1869 = *karafutonis* Matsumura, 1914.**Distribution:** AL, AT, BE, BG, CI, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LA, LI, ME, MD, NO, PL, PT, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SC, SL, SN, ES, SE, SW, UA, YU, EP, NE, NA, N-AC, TR.**Distribution in Turkey:** (01, 05, 06, 07, 10, 14, 16, 21, 24, 25, 30, 76, 33, 37, 42, 44, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66).

Bolu-Kızılcahamam, Sungurlu-Merzifon, Delice river-Sungurlu, Ankara-Delice river (Dlabola, 1971b); Adana prov.: Pozantı, Amasya prov.: Centre, Taşova, Ankara prov.: Centre, Çubuk, Elmadag, Eymir, Karagöl, Lalahan, Kızılcahamam, Polatlı, Balıkesir prov.: Balya, Bursa prov.: Gemlik, Diyarbakır prov.: Centre, Erzincan prov.: Centre, Çağlayan, Dumanlı dağları, Refahiye, Hakkari prov.: Centre, Iğdır prov., Kastamonu prov.: Tosya, Konya prov.: Akşehir, Mardin prov.: İdil, Muş prov.: Solhan, Sakarya prov.: Adapazarı prov.: Hendek, Siirt prov.: Kurtalan, Sinop prov.: Boyabat, Durağan, Uşak prov.: Bölme, Van prov.: Başkale, Güzeldere, Edremit, Erciş, Yozgat, Boğazlıyan, Sorgun (Lodos & Kalkandelen, 1987c); Sapanca gölü, Bolu prov.: Gerede, Ankara prov.: Mogan gölü, Nevşehir: Ürgüp, Malatya prov.: Darende, Balaban, Karahan Pass, Nurhak dağı, Topaluşığı, Kandilli, Erzurum prov., Tahir, Tahir geçidi, Van prov.: Başkale, Van gölü, Gevaş, İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Hakkari prov.: Dize, Yeni, Depin, Kıran, Güllüce, Güngör, Güçlü, Yukarı Ölçek (Kartal et al., 2001); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Balıkesir prov.: Zeytinli (Demir, 2006a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Sey Hamamı) (Demir,

2006b); Ankara prov.: Kalecik (Akyurt, İdrisdağı) (Demir, 2007b); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Düzlerçamı, Elmalı (Akçay, Centre, Çıglıkara, Gökpınar), Finike (Centre, Turunçova), Güllükdagi, Kemer (Centre, Çamyuva), Kale (Köşkerler), Kumluca (Kavakdibi), Korkuteli (Datköy, Ulucak, Korudağı, Kartal Yaylası, Söğütçük) (Demir, 2006c).

***Psammotettix cephalotes* (Herrich-Schaeffer, 1834)**

Synonym: = *citrinellus* Kirschbaum, 1868 = *normani* Scott, 1881 = *sulphurellus* Kirschbaum, 1868 = *tristis* Kirschbaum, 1868.

Distribution: AL, AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SL, SN, ES, SE, SW, NL, UA, YU, TR.

Distribution in Turkey: (06, 32, 42, 24, 65).

Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Polatlı, Karagöl, Çubuk Barajı, Elmadağ, Konya prov.: Çarıklar, Isparta prov.: Kayı (Kalkandelen, 1974); Erzincan prov.: Altıntepe, Van prov.: Başkale-Güzeldere (Lodos & Kalkandelen, 1987c); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyagıdıdağı, Memlik (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Demirciköy, Işıkdagi, Aköz) (Demir, 2006b); Ankara prov.: Sincan Mülk (Demir, 2007b).

***Psammotettix cerinus* (Lindberg, 1948)**

Distribution: CY, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 07, 31, 33).

Hatay prov.: Iskenderun (Linnavuori, 1965); Adana prov.: Kozan (Dlabola, 1957); Adana prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987c); İçel prov.: Erdemli (Dlabola, 1981); Adana prov.: Balcalı, Karataş, İçel: Alata (Başpınar & Uygun, 1992b); Antalya prov.: Alanya (Kargıcak, Keşefli, Okurcalar, Yeşilköy), Gazipaşa (Çalpınar-Kahyalar), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Çayyazı, Değirmenli, Demirciler, Centre-Çeltikçi, Külcüler, Belenobası, Karaöz, Yaylaalan) (Demir, 2006c).

***Psammotettix confinis* (Dahlbom, 1850)**

Synonym: = *eurylobus* Kirschbaum, 1868 = *heydeni* Fieber, 1872 = *remanei* Orosz, 1999 = *spathifer* Ribaut, 1925 = *thenii* Edwards, 1915.

Distribution: AL, AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, E-TR, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, RO, M-RU, N-RU, S-RU, SA, SC, SL, SN, SE, SW, NL, UA, YU, EP, NE, NA, TR.

Distribution in Turkey: (01, 04, 06, 07, 10, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 42, 76, 52, 55, 58, 65).

Hakkari prov.: Güçlü, Dize (Kartal et al., 2001); Adana prov.: Gavur Dağı, Ankara prov.: Mogan Gölü, Beynam, Konya prov.: Beyşehir, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Tatvan-Bitlis, Bitlis-Baykan (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Ankara-Elmadağ, Hasanoğlan, Kayaş, Eymir, Çubuk, Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Isparta prov.: Kayı, Eğridir (Kalkandelen, 1974); Ağrı prov.: Patnos, Tutak, Balıkesir prov.: Susurluk, Erzincan: Centre, Altıntepe, Çağlayan, Kovalık, Ilıç, Refahiye, Üzümlü, Erzurum prov.: İspir-Serçeme deresi, Tufanç, Giresun prov.: Şebinkarahisar, Iğdır prov., Ordu prov.: Kumru, Sivas prov.: Suşehri, Van prov.: Gevaş (Lodos & Kalkandelen, 1987c); Balıkesir prov.: Kazdağı National Park (Demir, 2006a); Antalya prov.: Elmalı (Tekkeköy) (Demir, 2006c).

***Psammotettix helvolus* (Kirschbaum, 1868)**

Synonym: = *obtusiceps* Kirschbaum, 1868 = *rhombifer* Fieber, 1869 = *substriatus* Then, 1902.

Distribution: AL, AT, BE, BG, CS, DK, FR, DE, GR, IT, PL, RO, S-RU, SA, SC, SL, SW, NL, YU, EP, N-AC, TR.

Distribution in Turkey: (06, 32).

Ankara prov.: Çubuk, Elmadağ, Isparta prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987c).

***Psammotettix majusculus* Linnavuori, 1951**

Distribution: CY, UA, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01).

Adana prov.: Pozantı (Linnavuori, 1965).

***Psammotettix nodosus* (Ribaut, 1925)**

Distribution: AL, AN, AT, BE, BT, BG, CS, DK, EE, FI, FR, DE, IE, IT, LA, LI, MD, NO, PL, PT, M-RU, N-RU, SL, ES, SE, SW, NL, UA, YU?, TR.

Distribution in Turkey: (07).

Antalya prov.: Alanya (Okurcalar), Manavgat (Centre) (Demir, 2006c).

***Psammotettix pictipennis* (Kirschbaum, 1868)**

Synonym: = *fasciatus* Fieber, 1869.

Distribution: AT, BG, GR, HU, MD, RO, S-RU, SN, ES, UA, YU, EP, NE, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 14, 18, 24, 30, 44, 46, 76, 38, 70, 51, 63, 65, 68, 74).

Hakkari prov.: Güllüce, Yeni, Güngör, Dize, Güçlü (Kartal et al., 2001); Adana prov.: Karataş, Ankara prov.: Mogan Gölü (Dlabola, 1957); İzmit-Düzce, Delice-Sungurlu (Dlabola, 1971b); Ankara prov.: Mogan gölü, Yukarı Kışla Köyü, Çubuk, Elmadağ (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Karataş, Ankara prov.: Kazan, Tuzgölü, Bolu prov.: Kıbrısçık, Seben, Çankırı prov.: Ilgaz, Yerkuyu, Erzincan prov.: Altın-tepe, Demirpınar, Maraş prov.: Türkoğlu, Iğdır prov., Kayseri prov.: Erciyes, Karaman prov., Niğde prov.: Ulukışla, Aksaray prov., Urfa prov.: Ceylanpınar, Van prov.: Centre, Bartın prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987c); Ankara prov.: Mogan gölü, Malatya prov.: Balaban, Van prov.: 16 km N Başkale (Dlabola, 1981); Antalya prov.: Akseki (Erenkaya), Manavgat (Bucakşeyhler) (Demir, 2006c).

***Psammotettix provincialis* (Ribaut, 1925)**

Distribution: BG, CY, CS, E-TR, FR, GR, HU, IT, MD, PT, RO, M-RU, S-RU, SA, SC, SW, UA, YU, EP, NE, OR, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 14, 18, 21, 22, 25, 34, 35, 38, 42, 50, 54, 55, 65).

Adana prov.: Karataş, Kozan, Abacılar, Ankara prov.: Mogan Gölü, Edirne prov. (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Çubuk, Yukarı Kışla Köyü, Karagöl, Kayaş, Ankara-Elmadağ, Lalahan, Eymir gölü, Gölbaşı, Beynam, Atatürk Orman Çiftliği, Anıttepe, Konya prov.: Akşehir, Meram, İçeri Çumra, Çarıklar, Kayseri prov.: Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Nevşehir prov.: Çat, Nar, Ürgüp, Kocaeli (Kalkandelen, 1974); Adana prov.: Ceyhan, Antalya prov.: Gülloluk, Bolu prov.: Kıbrısçık, Seben, Çankırı: Hacıhasan, Yerkuyu, Diyarbakır prov.: Centre, Erzurum, İstanbul prov.: Erenköy, İzmir prov.: Bornova, Narlıdere, Van prov.: Gürpınar, Kırkgeçit (Lodos & Kalkandelen, 1987c); East mediterranean region (Başpınar & Uygun, 1992b); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Demirciköy, Sey Hamamı, Işıkdığı, Karagöl, Soğuksu) (Demir, 2006b); Ankara: Kalecik (Gölköy), Sincan Mülk (Demir, 2007b); Antalya: Akseki (Geriş, Güçlüköy), Alanya (Yeşilköy), Elmalı (Çobanisa), Gündoğmuş (Çiçekoluk, Güneycik, Serinyaka), İbradı (Akşahap-İbradı), Kemer (Böğürtlenözü), Kaş (Kalkan, Üzümlü), Manavgat (Çayyazı) (Demir, 2006c).

***Psammotettix striatus* (Linnaeus, 1758)**

Distribution: S-RU, Palearctic region, NAs, TR.

Distribution in Turkey: (01, 06, 07, 38, 42, 50, 70).

East mediterranean region (Başpınar & Uygun, 1992b); Adana prov.: Kozan, Gavar Dağı, Centre, Karataş, Ankara prov.: Mogan Gölü, Baraj, Çamlidere, Işıkdığı, Beynam, Konya prov.: Beyşehir, Kayseri prov.: Erciyes (Dlabola, 1957); Çubuk Barajı, Çubuk, Karagöl, Yukarı Kışla Köyü, Ankara-Elmadağ, Lalahan, Hasanoğlu, Elmadağ, Eymir gölü, Atatürk Orman Çiftliği, Etimesgut, Kızılcahamam, Polath, Şereflikoçhisar, Konya prov.: Akşehir, Ereğli, Çarıklar, Meram, Çumra, İçeri Çumra, Karaman prov., Kayseri prov.: Yeşilhisar, Yahyalı, Nevşehir prov.: Göreme, Ürgüp, Nar, Boyalı, Çat, Kocaeli (Kalkandelen, 1974); Antalya prov.: Alanya (Kargıcak), Manavgat (Bucakşeyhler, Centre, Değirmenli, Demirciler, Belenobası, Centre-Çeltikçi, Taşağıl, Kilimli, Sağırın, Beşkonak, Hacıobası, Yaylaalan), Serik (Dikmen) (Demir, 2006c).

Genus: *Ebarrius* Ribaut, 1946***Ebarrius cognatus* (Fieber, 1869)**

Distribution: AL, AT, BT, BG, CS, FI, FR, DE, GR, HU, IT, NO, PL, RO, S-RU, SL, SE, SW, YU, NE, TR.

Distribution in Turkey: (05, 06, 07, 14, 18, 24, 36, 38, 51, 57, 65).

Amasya prov.: Akdağ, Suluova, Samsun prov.: Ladik, Sinop prov.: Boyabat (Zeybekoğlu, 1996); Kayseri prov.: Erciyes Dağı (Dlabola, 1957); Ankara prov.: Çubuk Barajı, Karagöl (Kalkandelen, 1974); Ankara prov.: Beynam, Çamlıdere, Kızılcahamam, Bolu prov.: Kıbrısık, Çankırı prov.: İnandık, Erzincan prov.: Kemaliye, Kars prov.: Sarıkamış, Niğde prov.: Ulukışla, Van prov.: Başkale (Lodos & Kalkandelen, 1987d); Tahir geçidi, Camak dağ, Aras dağları (Dlabola, 1981); Ankara prov.: Yenimahalle, Karyağdıdağı (Demir, 2004a); Ankara prov.: Kızılcahamam (Güvem, Keçikaya-Işıklıdağı, Soğuksu) (Demir, 2006b); Antalya prov.: Akseki (Güçlüköy) (Demir, 2006c).

Genus: *Jassargus Zachvatkin, 1933*

Synonym: *Lausulus* Ribaut, 1946

***Jassargus kurdicus* Remane and Schulz, 1976**

Distribution: IQ, TR.

Distribution in Turkey: (07, 71).

Kırıkkale prov. (Lodos & Kalkandelen, 1987d); Antalya prov.: Düzlerçamı (Demir, 2006c).

Genus: *Verdanus* Oman, 1949

***Verdanus (s. str.) hardei* (Dlabola, 1980)**

Distribution: AT, FR, SW, TR.

Distribution in Turkey: (20, 32).

Denizli prov., Isparta prov. (Kartal & Zeybekoğlu, 1997).

Genus: *Mocuellus* Ribaut, 1946

Synonym: = *Falcitettix* Linnavuori, 1953

***Mocuellus dlabolai* Kalkandelen, 1972**

Distribution: TR.

Distribution in Turkey: (06, 20, 23, 32, 46).

Ankara prov.: Çubuk Barajı (Kalkandelen, 1974); Elazığ prov.: Centre, Maraş: prov. Göksun (Lodos & Kalkandelen, 1987d); Ankara prov.: Çubuk Baraj, Denizli prov.: Yokuşbaşı, Isparta prov.: Çünür (Kartal & Zeybekoğlu, 1996).

LITERATURE CITED

Asche, M. 1982. Beiträge zur Delphaciden-Fauna der Türkei (Anatolien) (Homoptera Cicadina Delphacidae). Marburger Entomologische Publikationen 1(7): 71-98.

Başpınar, H. & Uygun, N. 1991a. Doğu Akdeniz Bölgesi turuncgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar I. Türkiye entomoloji dergisi 15(2): 89-106.

Başpınar, H. & Uygun, N. 1991b. Doğu Akdeniz Bölgesi turuncgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar II. Türkiye entomoloji dergisi 15(3): 157-172.

Başpınar, H. & Uygun, N. 1991c. Doğu Akdeniz Bölgesi turuncgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar III. Türkiye entomoloji dergisi 15(4): 203-222.

Başpınar, H. & Uygun, N. 1992a. Doğu Akdeniz Bölgesi turuncgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar IV. Türkiye entomoloji dergisi 16(1): 47-64.

Başpınar, H. & Uygun, N. 1992b. Doğu Akdeniz Bölgesi turuncgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar V. Türkiye entomoloji dergisi 16(2): 99-114.

- Boulard, M.** 1979. Cigales du genre *Cicada* Linne, originaires de Turquie (Hom. Cicadidae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 3(2): 67-74.
- Boulard, M.** 1993. *Pagiphora yanni*, Cigale anatolienne inedite. Description et premieres informations biologiques (cartes d'identite et d'ethologie sonores) (Homoptera, Cicadoidea, Tibicinidae). Türkiye Entomoloji Dergisi 17(1): 1-9.
- Demir, E.** 1998. Türkiye Homoptera Faunası İçin Yeni Kayıtlar (Homoptera, Auchenorrhyncha, Tropiduchidae). Centre Entomological Studies Ankara, Miscellaneous Papers 55/56: 1-3.
- Demir, E.** 2004a. Kayağdı Dağı (Ankara) Auchenorrhyncha Faunası Hakkında (Homoptera). Priamus 11(1/2): 17-27.
- Demir, E.** 2004b. *Goniagnathus guttulinervis* (Kirschbaum, 1868) new to Turkey, with data on ditribution of the Genus in Antalya (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae). Acta entomologica Slovenica 12 (2): 255-257.
- Demir, E.** 2005a. Review of *Paradorydium* Kirkaldy (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) from Turkey, with the description of a new species. Entomological News 116(2): 75-82.
- Demir, E.** 2005b. Two new records of Cicadellidae fauna in Turkey (Homoptera, Auchenorrhyncha). Zoology in the Middle East 35: 111.
- Demir, E.** 2006a. Preliminary report on the Auchenorrhyncha (Hemiptera) fauna of Kazdağı National Park with two new records for Turkey. Acta entomologica Slovenica 14 (1): 89-102.
- Demir, E.** 2006b. Contributions to the knowledge of Turkish Auchenorrhyncha (Homoptera) with a new record, *Pentastiridius nanus* (Ivanov, 1885). Munis entomology and zoology 1(1): 97-122.
- Demir, E.** 2006c. Contributions to the knowledge of Turkish Auchenorrhyncha with twelve new records (Homoptera: Cicadellidae). Munis entomology and zoology, 1(2): 215-236.
- Demir, E.** 2007a. Contributions to the Knowledge of Turkish Auchenorrhyncha (Homoptera, Fulgoromorpha and Cicadomorpha, excl. Cicadellidae) with a new record, *Setapius klapperichianus* Dlabola, 1988. Munis entomology and zoology, 2(1): 39-58.
- Demir, E.** 2007b. Auchenorrhyncha (Homoptera) data from Ankara with two new records to Turkey. Munis entomology and zoology, 2(2): 481-492.
- Dlabola, J.** 1957. Results of the Zoological Expedition of the National Museum in Prague to Turkey 20. Homoptera, Auchenorrhyncha. Acta entomologica Musei Nationale Pragae 31(469): 19-68.
- Dlabola, J.** 1971a. Taxonomische und Chorologische Ergänzungen der Zikadenfauna von Anatolien, Iran, Afghanistan und Pakistan (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta entomologica bohemoslovaca 68: 377-396.
- Dlabola, J.** 1971b. Taxonomische und chorologische Erzangungen zur türkischen und iranischen Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta faunistica entomologica Musei Nationale Pragae 14(163): 115-138.
- Dlabola, J.** 1974. Zur Taxonomie und Chorologie einiger Mediterraner Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae 20(3-4): 289-308.

Dlabola, J. 1977. Neue Zikaden-Taxone von *Mycterodus*, *Erythria*, *Selenocephalus* und *Goldeus* (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 23(3-4): 279-292.

Dlabola, J. 1979a. Neue Zikaden aus Anatolien, Iran und aus Südeuropäischen Ländern (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 25(3-4): 235-257.

Dlabola, J. 1979b. *Tshurtshurnella*, *Bubastia* und andere verwandte Taxone (Auchenorrhyncha, Issidae). Acta entomologica Bohemoslovaca 76: 266-286.

Dlabola, J. 1980. Tribus-Einteilung, neue Gattungen und Arten der subf. Issinae in der Eremischen Zone (Homoptera Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea V Praze 36(4): 173-248.

Dlabola, J. 1981. Ergebnisse der Tschechoslowakisch-Iranischen Entomologischen Expeditionen nach dem Iran (1970 und 1973). Acta entomologica Musei Nationale Praegae 40: 127-311.

Dlabola, J. 1982. Fortsetzung der Ergänzungen zur Issiden-Taxonomie von Anatolien, Iran und Griechenland (Homoptera, Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea V Praze 38(3): 113-169.

Dlabola, J. 1983a. Ergebnisse der Tschechoslovakisch-Iranischen Entomologischen Expeditionen 1970 und 1973 nach dem Iran. Acta Entomologica Musei Nationalis Praegae 41: 91-97.

Dlabola, J. 1983b. Neue mediterrane, meistens anatolische Issidaen (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta entomologica Bohemoslovaca 80:114-136.

Dlabola, J. 1984a. Neue Mediterrane, Eremische und Ostafrikanische Issiden-Taxone (Homoptera, Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea V Praze 40(3-4): 217-243.

Dlabola, J. 1984b. Typenrevision einiger mediterraner bzw. Nordafrikanischer Hysteropterum (s.l.) Auchenorrhyncha-Issidae. Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Praegae 17(195): 27-68.

Dlabola, J. 1985a. Neue Cixiide vom Iran, Nachbarländern und anderen Mediterrangebieten (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta entomologica Bohemoslovaca 82(2): 95-128.

Dlabola, J. 1985b. Zwei neue *Fieberiella*-Arten aus der Türkei und Spanien (Homoptera, Cicadellidae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 9: 75-78.

Dlabola, J. 1986. Neue Arten der Fulgoromorphen Zikaden-Familien vom Mittelmeergebiet und nahen Osten. Sbornik Narodniho Muzea V Praze 42(3-4): 169-196.

Dlabola, J. 1987. Neue ostmediterrane und iranische Zikadentaxone (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Entomol. Bohemoslov., 84: 295-312.

Dlabola, J. 1989. Neue Issiden und andere Zikadenarten des Mediterraneums und vom zuliegenden eremial (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Musei Nationalis Praegae 45 B(1): 21-59.

Dlabola, J. 1994. Ergänzungen zur iranischen, israelischen und benachbarten Zikadenfaunen mit Beschreibungen 30 neuer Taxone (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Musei Nationalis Praegae 49 B(1-4): 41-110.

- Emeljanov, A.F.** 2003. New taxa and new data on distribution of the subfamily Orgeriinae in the Mediterranean (Homoptera: Dictyopharidae). *Zoosystematica Rossica*, 11(2), 2002: 311-319.
- Fahringer, J.** 1922. Eine Rhynchotenausbeute aus der Türkei, Kleinasien und den benachbarten Gebieten. *Konowia* 1: 296-307.
- Gadeau de Kerville, H.** 1939. Recit Sommaire du Voyage en Liste Methodique des Invertebres et des Vertebres Recoltes en Asie-Mineure. Voyage Zoologique D'Henri Gadeau de Kerville en Asie-Mineure (Avril-Mai, 1912). Paul Le Chevalier, Paris. 148 pp.
- Gnezdilov, V.M.** 2002. New species of the genus *Tshurtshurnella* Kusnezov, 1927 (Homoptera, Cicadina, Issidae) from Turkey and Lebanon. *Russian Entomological Journal* 11(3): 233-240.
- Güçlü, Ş.** 1996. Studies on Delphacidae (Hom., Auchenorrhyncha) from Turkey. *Turkish Journal of Zoology* 20: 407-411.
- Güçlü, Ş.** 1997. On some Tettigometridae (Hemiptera, Auchenorrhyncha) from Turkey. *Zoology in the Middle East*, 15: 83-86.
- Haupt, H.** 1930. Ein neuer *Paralimnus* Mats. Aus Kleinasien (Homopt. Cicad.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* : 207-208.
- Hoch, H. & Remane, R.** 1985. Evolution und Speziation der Zikaden-Gattung *Hyalesthes* Signoret, 1865 (Homoptera, Auchenorrhyncha, Fulgoroidea, Cixiidae). *Marburger Entomologische Publikationen* 2(2): 1-427.
- Kalkandelen, A.** 1972. Orta Anadolu Cicadellidae: Euscelinae Faunasından Dört Yeni Tür ve Bir Alttür. *İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec.*, 37(3-4): 153-163.
- Kalkandelen, A.** 1974. Orta Anadolu'da Homoptera: Cicadellidae familyası türlerinin taksonomileri üzerinde araştırmalar. *Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü*, Ankara. 220 pp.
- Kalkandelen, A.** 1980. Contributions to the families Delphacidae and Cicadellidae (Homoptera) from Turkey. *Türk. Bitki kor. Derg.*, 4(3): 147-154.
- Kalkandelen, A.** 1985. Four new species of genus *Zyginidia* (*Zyginidia*) Haut (Homoptera: Cicadellidae) and with notes on the taxonomy and distributions of the species of this genus in Turkey. *Türk. Bitki kor. Derg.*, 9: 13-25.
- Kalkandelen, A.** 1987. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerine taksonomik çalışmalar I. *Bitki Koruma Bülteni* 27(3-4): 119-146.
- Kalkandelen, A.** 1988. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde taksonomik çalışmalar-II. *Bitki Koruma Bülteni* 28(3-4), 113-140.
- Kalkandelen, A.** 1989a. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde çalışmalar-III. *Bitki Koruma Bülteni* 29(1-2), 1-17.
- Kalkandelen, A.** 1989. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde taksonomik çalışmalar-IV. *Bitki Koruma Bülteni* 29(3-4), 117-132.
- Kalkandelen, A.** 1990. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde taksonomik çalışmalar-V. *Bitki Koruma Bülteni* 30(1-4), 3-27.
- Kalkandelen, A.** 1993. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerinde taksonomik çalışmalar-VI. *Bitki Koruma Bülteni* 33(3-4), 65-82.

Kalkandelen, A. 1994. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerindeki taksonomik çalışmalar-VII. Bitki Koruma Bülteni 34(1-2), 1-21.

Kalkandelen, A. 2000. Türkiye Cixiidae (Homoptera) türleri üzerindeki taksonomik çalışmalar-VIII. Bitki Koruma Bülteni 40(3-4). 91-123.

Kartal, V. 1980. Neue und wenig bekannte Arten der Gattungen Cicadetta und Cicadatra aus dem Irak und der Türkei (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadidae). Entomologische Zeitschrift 17: 185-192.

Kartal, V. 1981. Neue Homopteren aus der Türkei-I. Priamus 1(1): 24-30.

Kartal, V. 1983. Neue Homopteren aus der Türkei II (Homoptera Auchenorrhyncha). Marburger Entomologische Publikation 1(8): 235-248.

Kartal, V. 1985a. Neue und wenig bekannte *Tshurtshurnella*-Arten (Homoptera Auchenorrhyncha Issidae) aus der Türkei. Marburger Entomologische Publikationen 1(10): 191-218.

Kartal, V. 1985b. Türkiye Yukarı Kızılırmak Havzasındaki Issidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) Familyası Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi. Doğa A2: 64-77.

Kartal, V. 1986. Wenig bekannte und für die Türkei neue *Nymphorgerius*-Arten (Homoptera, Auchenorrhyncha, Dictyopharidae). Türk. Bitki kor. Derg., 10(2): 99-103.

Kartal, V. 1987. Eine neue und wenig bekannte Arten der Gattung *Ranissus* aus der Türkei (Homoptera, Auchenorrhyncha, Dictyopharidae). Türk. Entomol. Derg., 11(3): 145-150.

Kartal, V. 1988. Türkiye Cicadellid Faunası İçin Yeni Bir Cins *Kazachtanicus* Dlab., 1961 (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae). Doğa Zool., D. : 68-69.

Kartal, V. & Ü. Zeybekoğlu, 1992. Türkiye Cicadellidae (Hom., Auchenorrhyncha) Faunası İçin Yeni Türler. Tr. J. of Zoology, 16: 349-352.

Kartal, V., Zeybekoğlu, Ü. & Özdemir, G. 1994. Samsun Çevresinde Cercopidae (Hom., Auchenorrhyncha) Familyası Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi 5(1): 147-157.

Kartal, V. & Ü. Zeybekoğlu, 1994. A New Species *Allygidius nihati* n. sp. (Hom., Auch., Cicadellidae) from Turkey. Tr. J. of Zoology, 18: 259-261.

Kartal, V. & Ü. Zeybekoğlu, 1994. Türkiye Cicadellidae (Hom., Auchenorrhyncha) Faunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı. Tr. J. of Zoology, 18: 37-39.

Kartal, V. & Ü. Zeybekoğlu, 1997. Türkiye Faunası İçin Yeni Üç *Diplocoenus* Rib. (Hom., Auch., Cicadellidae, Deltocephalinae) Türü Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology, 21: 291-294.

Kartal, V., Zeybekoğlu, Ü. & Dursun, A. 2001. A faunistic study on Deltocephalinae (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) in Yüksekova (Hakkari). Türkiye entomoloji dergisi 25(2): 83-92.

Linnavuori, R. 1965. Studies on the South and East-Mediterranean Hemipterous fauna. Acta Entomologica Fennica, Helsinki 21: 1-70.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1980a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey I. Family Cixiidae Spinola. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 4(1): 15-27.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1980b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey II. Family Delpacidiae Leach. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 4(2): 103-117.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1980c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey III. Families Meenoplidae, Derbidae, Achilidae, Dictyopharidae and Tettigometridae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 4(3): 161-178.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1981a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey IV. Family Issidae Spinola. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 5(1): 5-21.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1981b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey V. Families Flatidae, Ricaniidae and Cicadidae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 5(2): 67-82.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1981c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey VI. Families Cercopidae and Membracidae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 5(3): 133-149.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1981. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey VII. Family Cicadellidae: Ulopinae, Megophthalminae, Ledrinae, Macropsinae and Agallinae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 5(4): 215-230.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1982a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey VIII. Family Cicadellidae: Idiocerinae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 6(1): 15-28.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1982b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey IX. Family Cicadellidae: Iassininae, Penthiminae, Dorycephalinae, Hecalinae and Aphrodinae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 6: 147-159.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1983a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey X. Family Cicadellidae: Xestocephalinae, Stegelytrinae and Cicadellinae. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7: 23-28.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1983b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XI. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Alebrini and Dikraneurini. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7: 107-115.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1983c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XII. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Emposcini. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 7: 153-165.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1984a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XIII. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Typhlocybini (Part I). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 8: 33-44.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1984b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XIV. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Typhlocybini (Part II). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 8: 87-97.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1984b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XVI. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Erythroneurini (Part II). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 8: 201-210.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1984c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XV. Family Cicadellidae, Typhlocybinae: Erythroneurini (Part I). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 8: 159-168.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1985a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XVII. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Grypotini, Goniagnathini and Opsini (Part I). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 9: 79-90.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1985b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XVIII. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Macrostelini (Part II). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 9(3): 147-161.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1985c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XIX. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Deltocephalini, Scaphytopiini, Doraturini. *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 9: 207-215.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1986a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XX. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Fieberiellini, Stirellini and Tetartostylini. *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 10(1): 25-32.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1986b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXI. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Athysanini (Part I). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 10(3): 131-139.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1986c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXII. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Athysanini (Part II). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 10(4): 203-211.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1987a. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXIII. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Athysanini (Part III). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 11(1): 29-40.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1987b. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXIV. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Athysanini (Part IV). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 11(2): 97-109.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1987c. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXV. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Paralimnini Distans (Part I). *Türkiye Entomoloji Dergisi* 11(3): 151-162.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1987d. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXVI. Family Cicadellidae, Deltocephalinae: Paralimnini Distans (Part II). *Türkiye Entomoloji Dergisi* 11(4): 195-202.

Lodos, N. & Kalkandelen, A. 1988. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey XXVII. (Addenda and Corrigenda). *Türkiye Entomoloji Dergisi* 12(1): 11-22.

Meyer-Arndt, S. 1988. Vier neue Arten der Gattung *Fieberiella* Signoret, 1879 aus Griechenland und der Türkei (Homoptera Auchenorrhyncha Cicadellidae). *Marburger Entomologische Publikation* 2(4): 179-208.

Meyer-Arndt, S., 1991. A new species of *Fieberiella* Signoret, 1879 (Hem., Cicadellidae) from western Turkey and the Aegean Islands with new locality records for the Genus. *Entomologist's Monthly Magazine*, 127: 61-72.

Zachvatkin, A. A. 1937. Deux *Zyginidia* novellus des Turquie (Homoptera, Eupterygidae). *Soc. Nat. Moscou (Sect. Biol.) Bull.* 46: 317-322.

Zachvatkin, A. A. 1946. Studies on the Homoptera of Turkey. Trans. R. Ent. Soc. London 97(6): 149-176.

Zeybekođlu, Ő., 1993. Orta Karadeniz Bölgesi *Macrosteles* Fieb. (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Deltocephalinae) Cinsinin Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology, 17: 355-365.

Zeybekođlu, Ő., 1994. Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan *Grypotes* Fieb. (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Deltocephalinae) Cinsinin Türleri Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Tr. J. of Zoology, 18: 61-63.

Zeybekođlu, Ő. 1996. Türkiye’de saptanan Ebarrius Ribaut, 1946 (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Deltocephalinae) cinsine bađlı türler üzerine sistematik bir araştırma. Turkish Journal of Zoology 20: 187-189.

Zeybekođlu, Ő. 1998. The species of Deltocephalinae (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) found in the Middle and East Black Sea Regions. Türkiye Entomoloji Dergisi 22(1): 37-45.

Zeybekođlu, Ő., 2000. Morphological variations in the *Selenocephalus* Germar, 1833 species in the Black Sea Region of Turkey (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae). Acta ent. Slovenica, 8(1): 49-58.

